

AVES & CÉRDOOS



Innovación a nivel global

Albania • Antillas Holandesas • Arabia Saudita • Argelia • Azerbaiyán • Baréin • Bangladesh • Barbados • Bielorrusia
Bolivia • Bulgaria • Camboya • Chipre • Colombia • Costa Rica • Ecuador • Egipto • Emiratos Árabes Unidos
El Salvador • Etiopía • Filipinas • Guatemala • Honduras • India • Mauricio • Jordania • Kenia • Corea del Sur
Kuwait • Kirguistán • Líbano • Libia • México • Nicaragua • Nigeria • Omán • Pakistán • Panamá • Paraguay • Perú
Qatar • República Dominicana • Rusia • Sri Lanka • Siria • Ucrania • Uruguay • Vietnam





agrovetmarket
animalhealth

Productos Veterinarios de **Clase Única**
Unique Veterinary Products

NUESTRA MISIÓN: “Productos de Clase Única”

Ofrecer productos farmacéuticos y nutricionales veterinarios de clase única; desarrollados de manera creativa e innovadora, con estándares elevados de calidad que nos permitan una proyección internacional y la consolidación local a través del establecimiento formal de alianzas estratégicas.

NUESTRA VISIÓN: “Liderazgo de Valor”

En el 2030, seremos la empresa líder del mercado de farmacéuticos para uso veterinario en Latinoamérica, no sólo en el nivel de ventas, sino también en innovación, creación de valor y excelencia de nuestros procesos; con productos registrables en cualquier país del mundo y con un componente elevado de responsabilidad social.



agrovetmarket
animalhealth





Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
Válido hasta:
2020-10-20
www.tuv.com
ID 9105063844

BPM / GMP

El desarrollo de nuestro portafolio y su registro en diferentes países se basa en la investigación farmacéutica, clínica y científica. Elaboramos formulaciones únicas e innovadoras orientadas a la prevención y tratamiento con el objetivo de satisfacer las necesidades de los veterinarios y productores.

La calidad de nuestros procesos es validada a través de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de SENASA y la certificación ISO 9001 de TÜV Rheinland.

Índice



Fármacos

Polvos Solubles	_____	3
Premezclas	_____	11
Soluciones Orales	_____	26
Otros	_____	31



Nutricionales

Soluciones Orales	_____	41
Polvos Solubles	_____	50
Premezclas	_____	55

Avivet®

Ingredientes de Avanzada





Polvos Solubles

Amoxycol® WS

Colistix® WS

Neo-Terraciclina® WS

Trisulprim® WS

Tylamox® WS

Tylodox® WS

Tylvax® WS



Amoxycol® WS

*Potente combinación antibiótica
betalactámica-polipéptido de amplio espectro*



Polvo
Soluble



Hipersoluble



Composición

Cada 100 g contiene: Amoxicilina 20 g, colistina (sulfato) 4 g (equivalente a 120 000 000 UI) excipientes c.s.p 100 g.

Descripción

Amoxycol® WS, es una asociación antibiótica bactericida para administración en el agua de bebida o alimento. Provee 200 mg/g de actividad de amoxicilina y 40 mg/g de colistina (1.2 millones UI/g actividad). La asociación de amoxicilina y colistina ofrece un efecto aditivo y sinérgico.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina y/o colistina, infecciones del aparato respiratorio, digestivo, urogenital e infecciones de piel y tejidos blandos y prevención de infecciones bacterianas secundarias.

Aves: Infecciones respiratorias, salmonelosis, colibacilosis, cólera, enteritis necrótica ulcerativa, estafilo y estreptococosis, coriza, saculitis.

Porcinos: Infecciones respiratorias inespecíficas, rinitis atrófica, enterotoxemia causada por *E. coli* (enfermedad del edema), colibacilosis, erisipelosis, leptospirosis, dermatitis, entre otras.


Dosis

Aves: Preventivo: 1 kg/2 000 L de agua (o en 1 000 kg de alimento) durante 3 - 5 días. Tratamiento: 1 kg/1 500 - 2 000 L agua (o en 750 - 1 000 kg de alimento) durante 3 - 5 días.

Porcinos: Preventivo: 1 kg/1 500 L agua (o en 750 kg de alimento) durante 3 - 5 días. Tratamiento: 1kg/1 000 - 1 500 L agua (o en 500 - 750 kg de alimento) durante 3 - 5 días. Individual: 1 - 2 g/10 kg de p.v.

Presentación

15 g, 100 g, 1 kg y 10 kg.



Colistix® WS

*Antibiótico polipeptido
para infecciones entéricas*



Polvo
Soluble

Composición

Cada 100 g contiene: Colistina (sulfato) 10 g (*), excipientes c.s.p. 100 g.

(*) cada gramo de Colistix® WS contiene 3 millones UI de colistina base.

Descripción

Colistix® WS es un antibiótico para la medicación del agua de bebida. Provee 100 mg/g (3 millones UI/g) de actividad y es muy eficaz contra la mayoría de bacterias Gram – e inactiva sus endotoxinas. Es activo solamente dentro del tracto gastrointestinal pues no se absorbe por lo que es ideal en infecciones entéricas.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas causadas por microorganismos sensibles a la colistina.

Aves: Tifosis (*Salmonella gallinarum*), pulorosis (*Salmonella pullorum*), colibacilosis.

Pocrinos: Enterotoxemia, colibacilosis entérica, salmonelosis, diarreas de diversa etiología, infecciones bacterianas secundarias.

Dosis

Aves: Preventivo: 100 – 200 g/1 000 L de agua ó 750 g de alimento, terapéutico: 300 – 400 g/1 000 L por 5 – 7 días.

Porcinos: Preventivo: 200 – 300 g/1 000 L de agua ó 500 kg de alimento, terapéutico: 300 – 500 g/1 000 L por 5 – 7 días.

Presentación

50 g, 100 g, 1 kg y 10 kg.



Neo-Terraciclina® WS

Combinación antibiótica de amplio espectro y doble efecto.



Composición

Cada 100 g contiene: Oxitetraciclina clorhidrato 20 g, neomicina sulfato 20 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Neo-Terraciclina® WS es una combinación antibacteriana oral en forma de polvo soluble para la medicación del agua de bebida o alimento. Provee 200 mg/g de actividad de oxitetraciclina clorhidrato y 200 mg/g de neomicina sulfato. La asociación posee efecto sinérgico y un amplio espectro con el beneficio de un doble efecto: sistémico y local.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes Gram+ o Gram – sensibles a la oxitetraciclina y/o neomicina; principalmente infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Aves: Salmonelosis, colibacilosis, coriza, neumonías inespecíficas, aerosaculitis, sinovitis, infecciones secundarias a cuadros virales.

Porcinos: Diarreas, enterotoxemias, salmonelosis, colibacilosis, disentería, neumonías inespecíficas, rinitis atrófica, enfermedad respiratoria crónica, MMA, infecciones secundarias a cuadros virales entre otras.

Dosis

Vía oral mezclado en el agua de bebida o alimento.

Aves: Preventivo: 250 - 500 g/1 000 L de agua o 500 kg de alimento. Tratamiento: 500 g - 1 kg/1 000 L de agua o 500 kg de alimento por 3 - 5 días.

Porcinos: Preventivo: 250 g/1 000 L de agua o 400 kg de alimento. Tratamiento: 500g - 1 kg/1 000 L de agua o 400 kg de alimento, por 4 - 5 días.

Presentación

15 g, 100 g, 1 kg y 10 kg.



Trisulprim® WS

*Asociación sinérgica bactericida
de doble protección*



Polvo
Soluble

Composición

Cada 100 g contiene: Sulfadiazina (sulfadiazina sódica) 42 g, trimetoprim 8 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Trisulprim® WS es una combinación antibacteriana oral en forma de polvo soluble para la medicación del agua de bebida o alimento. Provee 420 mg/g de actividad de sulfadiazina sódica y 80 mg/g de trimetoprim. La asociación posee efecto sinérgico bactericida.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la sulfadiazina y/o trimetoprim. Infecciones del aparato digestivo, respiratorio, urogenital e infecciones de piel y tejidos blandos, prevención de infecciones bacterianas secundarias.

Aves: Infecciones respiratorias, salmonelosis, colibacilosis, cólera, coriza, estafilo y estreptococosis, onfalitis e infección del saco vitelino, saculitis, sinusitis, sinovitis, dermatitis gangrenosa.

Porcinos: Infecciones respiratorias inespecíficas, rinitis atrófica, enterotoxemia por *E. coli* (enfermedad del edema), colibacilosis entérica, salmonelosis, diarrea neonatal, diarrea de los lechones, diarrea posdestete, diarreas bacterianas, corinebacteriosis, erisipelosis, dermatitis, metritis-mastitis-agalactia (MMA) de origen bacteriano, entre otras.

Dosis

Vía oral mezclado en el agua de bebida o vía alimento.

Aves: 200 - 500 g/1 000 L de agua o 500 kg de alimento, c/24 h por 5 días.

Porcinos: 200 - 500 g/1 000 L de agua o 500 kg/alimento, c/24 horas por 7 días.

Presentación

15 g, 100 g, 1 kg y 10 kg.



Tylamox® WS

*Asociación macrólido - betalactámico
de acción sinérgica - aditiva de amplio espectro*



Composición

Cada 100 g contiene: Tilosina (tartrato) 50 g, amoxicilina (trihidrato) 10 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Tylamox® WS es una asociación antibiótica - sinérgica - aditiva de amplio espectro para su administración en el agua de bebida o alimento. Provee 500mg/g de actividad de tilosina y 100 mg/g de actividad de amoxicilina. Está indicado para la prevención y el tratamiento de un gran número de infecciones en aves. La asociación ofrece un efecto sinérgico - aditivo.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la tilosina y/o amoxicilina: infecciones del aparato respiratorio, digestivo, urogenital; infecciones de piel y tejidos blandos y prevención de infecciones bacterianas secundarias.

Aves: ERC y otras infecciones respiratorias, salmonelosis, colibacilosis, cólera, enteritis necrótica, estafilo y estreptococosis, coriza, infección del saco vitelino, saculitis, sinusitis, sinovitis.

Porcinos: Neumonía enzootica, disentería porcina, infecciones respiratorias inespecíficas, rinitis atrófica, enfermedad del edema, colibacilosis, salmonelosis, diarrea neonatal, post-destete, entre otras.

Dosis

Vía oral mezclado en el agua de bebida (o vía alimento) por 3 a 5 días.

Aves: 1kg/2 000 L de agua (o en 1 000 kg de alimento). Preventivo frente a micoplasmosis y terapéutico: 1 kg/1 000 L de agua (o en 500 kg de alimento).

Porcinos: Preventivo: 1kg/4 000 L de agua (o en 2 000 kg de alimento). Terapéutico: 1kg/ 2 000 - 4 000 L de agua (o en 1 000 - 2 000 kg de alimento).

Presentación

15 g, 100 g, 1 kg y 10 kg.



Tylodox® WS

*Asociación antibiótica aditiva
macrólido – tetraciclina de amplio espectro.*



Hipersoluble



Polvo
Soluble

Composición

Cada 100 g contiene: Tilosina (tartrato) 10 g, doxiciclina (hiclato) 10 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Tylodox® WS es una asociación antibiótica bacteriostática - aditiva de amplio espectro para su administración en el agua de bebida o alimento. Provee 100 mg/g de actividad de tilosina y 100 mg/g de doxiciclina. Está indicado para la prevención y el tratamiento de un gran número de infecciones en aves y cerdos y otras especies domésticas. La asociación de tilosina y doxiciclina ofrece un efecto aditivo.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones causadas por gérmenes sensibles a la tilosina y/o doxiciclina en infecciones del aparato respiratorio, digestivo y urogenital.

Aves: Micoplasmosis, ERC, coriza, colibacilosis, onfalitis e infección del saco vitelino, cólera aviar, enteritis, diarreas, enteritis necrótica, saculitis, sinusitis, estafilo y estreptococosis, corinebacteriosis.

Porcinos: Micoplasmosis, ERC, colibacilosis, enteritis y diarreas bacterianas, stafilo y estreptococosis, leptospirosis, entre otras.

Dosis

Aves y porcinos: Preventivo: 1 kg/2 000 L de agua (o en 1 000 kg de alimento) durante 3 - 5 días. Tratamiento: 1 kg/1 000 - 1 500 L agua (o en 500 - 750 kg de alimento) durante 3 - 5 días.

Presentación

15 g, 100 g, 1 kg y 10 kg.



Tylvax® WS

*Antibiótico macrólido
de última generación*



Composición

Cada 100 g contiene: Tilvalosina* (tartrato) 25 g, excipientes c.s.p. 100 g.
*acetil-isovaleril tilosina

Descripción

Tylvax® WS es un antibiótico oral macrólido para la medicación del agua de bebida de aves y cerdos. Provee 250 mg/g de actividad y es muy eficaz frente a diferentes enfermedades importantes en cerdos y aves de corral. Tylvax® WS actúa contra microorganismos Gram+ y algunos Gram – y ofrece una excepcional actividad antimicoplásmica. Su eficacia es hasta diez veces mayor que la tilosina y no tiene periodo de retiro en gallinas de postura.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina.

Aves: Enfermedad respiratoria crónica por micoplasmosis, enteritis necrótica, enteritis bacteriana e infecciones por *Ornithobacterium rhinotracheale*.

Porcinos: Neumonía micoplásmica (enzootica), ileítis, disentería y colitis porcina.

Dosis

Aves: Preventivo: 80 - 100 g/200 L agua (3 primeros días de vida) y 40 - 60 g/200 L agua (3 - 4 días más o en situaciones de estrés posteriores). Terapéutico: 80 - 100 g/200 L agua por 3 días.

Porcinos: Preventivo: 200 g/1 000 L por 3 - 4 días. Terapéutico: 200 g/1 000 L agua por 5 días.

Presentación

15 g, 100 g, 1 kg, 10 kg y 20 kg.

Premezclas

Aureomycin® G200 / Aureocyclin® G200 Px

Colistix® C100 Px

Coverflox® C100 Px

Cyromix® 100 Px

Gallomec® Plus Px

L-Spectomix® 4.4% Px

L-Spectomix® 8.8% Px

Micromutin® C40 Px

Micromutin® C80 Px

Porcimec® 2 Px

Tygran® G100 Px

Tylvax® Px

Tylvax® C Px

Valnemix® C100 Px



Aureomycin® G200 Px

Aureocyclin® G200 Px

Antibiótico tetraciclínico de amplio espectro



Composición

Cada 100g de contiene: Clortetraciclina granulada 20%; excipientes c.s.p 100g

Descripción

Aureomycin® G200 Px es una mezcla antibiótica de flujo libre en base a clortetraciclina para la medicación del alimento. Su fórmula granulada le proporciona propiedades excepcionales como: Fluidez, facilitando la dosificación y dispersabilidad del producto, al mismo tiempo que reduce su densidad, homogeneidad y rendimiento de la mezcla, reduce los riesgos inherentes a la generación de polvo: inhalación, contaminación cruzada, suciedad, entre otros.

Indicaciones

Aves: Tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas como ERC, micoplasmosis, colibacilosis, entre otras.

Porcinos: Tratamiento de rinitis atrofica, leptospirosis y neumonías causadas por neumococos.

Dosis

Aves: 10-60 mg de clortetraciclina/kg de peso vivo. Promotor: 250-500g/TM (50-100ppm de clortetraciclina) de forma continua. Preventivo: 500g-1kg/TM (100-200 ppm de clortetraciclina) durante 14 días y/o durante el periodo de riesgo. Terapéutico: 1-3kg/TM (200-600 ppm de clortetraciclina) durante 7 días.

Porcinos: 5-20 mg de clortetraciclina/kg de peso vivo. Promotor: 250-300g/TM (50-60ppm de clortetraciclina) de forma continua. Preventivo: 500g-1kg/TM (100-200 ppm de clortetraciclina) durante 14 días y/o durante el periodo de riesgo. Terapéutico: 1-2kg/TM (200-400 ppm de clortetraciclina) durante 7 días.

Presentación

25 Kg.



Colistix® C100 Px

*Antibiótico polipéptido microencapsulado
para infecciones entéricas*



Premezcla



Línea de
Microencapsulados
SMART-CAP



Premezcla

Composición

Cada 100 g contiene: Colistina (sulfato) microencapsulada 10 g (*), excipientes c.s.p. 100 g.

(*) cada gramo de Colistix® C100 Px contiene 3 millones UI de colistina base.

Descripción

Colistix® C100 Px un producto antibiótico para la medicación del alimento. Provee 100 mg/g de polimixina E (3 millones UI/d actividad) y es muy eficaz contra la mayoría de bacterias Gram – e inactiva sus endotoxinas. Actúa solo dentro del tracto gastrointestinal (no se absorbe); así, es ideal en infecciones entéricas y como promotor de crecimiento. La microencapsulación le confiere estabilidad, mejor acción antibacteriana, permite un mezclado más homogéneo y menor pérdida del producto.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas causadas por microorganismos sensibles a la colistina y como promotor de crecimiento.

Aves: Tifosis, pulorosis, colibacilosis, infecciones secundarias.

Porcinos: Enterotoxemia, colibacilosis entérica, salmonelosis, diarreas de diversa etiología, infecciones secundarias.

Dosis

Aves: 75 000 - 100 000 UI/kg peso vivo/día (hasta 125 000 en casos muy graves), en la práctica: Promotor: 100 - 150 g/TM alimento, continuo. Preventivo: 150 - 300 g/TM alimento durante el período de riesgo. Terapéutico: 400 - 600 g/TM alimento por 5 - 7 días.

Porcinos: 100 000 UI/kg peso vivo/día, en la práctica: Promotor: 200 - 300 g/TM alimento, continuo. Preventivo: 400 - 600 g/TM alimento durante el período de riesgo. Terapéutico: 600 - 1 000 g/TM alimento por 5 - 7 días.

Presentación

20 kg.



Coverflox® C100 Px

Enrofloxacin microencapsulada.
Antibiótico de amplio espectro.



Premezcla



Línea de
Microencapsulados
SMART-CAP



Composición

Cada 100g contiene: 10 g de Enrofloxacin; excipientes c.s.p 100g

Descripción

Coverflox® C100 Px es una mezcla antibiótica en base a gránulos microencapsulados conteniendo enrofloxacin. El proceso de microencapsulación confiere una serie de propiedades excepcionales: mayor estabilidad a la molécula, resistencia al peletizado, enmascara el olor y sabor, liberación de la droga en el sitio adecuado, mejora la estabilidad de la droga y mantiene la actividad farmacológica al momento del mezclado y premezclado, reduciendo los riesgos inherentes a la generación de polvo.

Indicaciones

Aves: Prevención y tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica (ERC) y de la saculitis aérea y sinusitis infecciosa causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* y *Mycoplasma meleagridis*. Coriza infecciosa, cólera aviar, infección del saco vitelino causada, enteritis necrótica por *Clostridium perfringens*. y para el control y tratamiento de enfermedades ocasionadas por *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Streptococcus* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, entre otras.

Porcinos: Tratamiento y prevención de enfermedades entéricas asociadas a *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp., *Klebsiella* spp., entre otros. Tratamiento y control de rinitis atrófica y la neumonía enzoótica asociadas a múltiples factores. Efectivo contra *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, entre otras. Tratamiento, prevención y control de la enfermedad de Glässer causada por *Haemophilus parasuis*. Colisepticemia, infecciones por *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Corynebacterium* spp., síndrome MMA, erisipela por *Erysipelothrix rhusiopathiae*, entre otros.

Dosis

Aves: 10 mg/Kg, equivalente a, 0.5 Kg – 1 Kg del producto por 1000 kg de alimento durante 3 – 5 días.

Porcinos: 2.5 – 10 mg/Kg, equivalente 0.5 Kg – 2 Kg del producto por 1000 Kg de alimento durante 3 – 7 días.

Presentación

25 Kg.



Cyromix® 100 Px

Larvicida regulador de crecimiento
para medicación oral



Premezcla

Composición

Cada 100 g contiene: Ciromazina 10 g, excipientes c.s.p 100 g

Descripción

Cyromix® 100 Px es una premezcla medicamentosa que contiene un regulador sintético de crecimiento de insectos que actúa inhibiendo la muda y la pupación.

Indicaciones

Aditivo alimenticio para el control de larvas de las moscas (Mosca del establo: *Stomoxys calcitrans*, mosca del cuerno, *Haematobia irritans*, pequeña mosca doméstica *Fannia canicularis*, mosca del estiércol de los pollos *Fannia pusio*, mosca doméstica, *Musca domestica*, mosca de la fruta *Drosophila melanogaster*) y pulgas en aves (Pulga de la gallina *Echidnophaga gallinacea*, pulga del hombre *Pulex irritans*).

Dosis

Aves: 500 g por tonelada de alimento por dos períodos de 4 a 6 semanas, con un intervalo de 4 a 6 semanas sin tratamiento. Para reducir de inmediato la población de moscas, debe aplicarse Cyromix® 100 Px y un adulticida como No-Fly.

En materia orgánica: 1000 g por tonelada de materia a tratar. Después de esparcir el producto se recomienda revolver la materia tratada.

Presentación

100 g, 1 kg, 20 kg



Gallomec® Plus Px

*Antiparasitario de espectro total
específico para aves*



Línea de
Microencapsulados
SMART-CAP



Composición

Cada 100 g contiene: Ivermectina 0.21 g, fenbendazole 5.10 g, praziquantel 6 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Gallomec® Plus Px es una asociación antiparasitaria de espectro total para su administración en el alimento.

Indicaciones

Tratamiento y control de todos los parásitos gastrointestinales, tráqueo-pulmonares y renales en todas sus etapas de desarrollo. Además de nematodos, elimina céstodos, controlando ectoparásitos como ácaros de las patas, ácaro rojo, ácaros de la piel y cola, y ayuda en el control de piojos (piojillo).

Dosis

Aves de engorde: 300g / Tonelada

Aves de postura comercial: 600g / Tonelada

Reproductoras: 1.2 kg / Tonelada

Presentación

15 g, 100 g, 1 kg, 10 kg y 20 kg.



L-Spectomix® 4.4% Px

*Combinación antibiótica sinérgica
de amplio espectro*



Premezcla



Premezcla

Composición

Cada 100 g contiene: Lincomicina (clorhidrato) 2.2 g, espectinomina (sulfato) 2.2 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

L-Spectomix® 4.4% Px es un producto antibiótico sinérgico de amplio espectro para la medicación del alimento de aves y cerdos. Provee 22 mg/g de actividad de lincomicina y 22 mg/g de espectinomina. Está indicado para la prevención y el tratamiento de un gran número de procesos infecciosos en aves y cerdos, así también como promotor de crecimiento.

Indicaciones

Tratamiento, control y/o prevención de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la acción de lincomicina y/o espectinomina; mejora el índice de crecimiento y la conversión alimenticia.

Aves: Enfermedad respiratoria crónica (micoplasmosis), saculitis aérea y sinusitis infecciosa, salmonelosis, enteritis asociada a *E. coli* y a *Clostridium perfringens*.

Porcinos: Salmonelosis, enteritis por *E. coli*, disentería porcina, neumonía enzoótica micoplásmica, colitis porcina, ileitis, síndrome de mastitis-metritis-agalactia.

Dosis

Como promotor: 250-500 g/TM de alimento. Preventivo y/o control: 1 - 2.5 kg/TM de alimento.

Terapéutico:

Aves: 2.5 - 5 kg/TM de alimento por 21 días.

Porcinos: 1 - 3 kg/TM de alimento por 21 días.

Presentación

20 kg.



L-Spectomix® 8.8% Px

*Combinación antibiótica sinérgica
de amplio espectro en doble concentración*



Premezcla



Composición

Cada 100 g contiene: Lincomicina (clorhidrato) 4.4 g, espectinomina (sulfato) 4.4 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

L-Spectomix® 8.8% Px es un producto antibiótico sinérgico de amplio espectro para la medicación del alimento de aves y cerdos. Provee 44 mg/g de actividad de lincomicina y 44 mg/g de espectinomina. Está indicado para la prevención y el tratamiento de un gran número de procesos infecciosos en aves y cerdos, así también como promotor de crecimiento.

Indicaciones

Tratamiento, control y/o prevención de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la acción de lincomicina y/o espectinomina; mejora el índice de crecimiento y la conversión alimenticia.

Aves: Enfermedad respiratoria crónica (micoplasmosis), saculitis aérea y sinusitis infecciosa, salmonelosis, enteritis asociada a *E. coli* y a *Clostridium perfringens*.

Porcinos: Salmonelosis, enteritis por *E. coli*, disentería porcina, neumonía enzoótica micoplásmica, colitis porcina, ileítis, síndrome de mastitis-metritis-agalactia.

Dosis

Como promotor: 125-250 g/TM de alimento. Preventivo y/o control: 500 g - 1.25 kg/TM de alimento.

Terapéutico:

Aves: 1.25 - 2.5 kg de alimento/TM por 21 días.

Porcinos: 500 g - 1.5 kg/TM de alimento por 21 días.

Presentación

20 kg.



Micromutin® C40 Px

*Pleuromutilina microencapsulada
de última generación*



Premezcla

Composición

Cada 100 g de Micromutin® C40 Px contiene: Tiamulina fumarato 40 g, excipientes c.s.p 100 g

Descripción

Micromutin® C40 Px es un producto antibiótico muy eficaz en base a gránulos microencapsulados para la medicación del alimento de aves y cerdos. Provee 400 mg/g de actividad. La microencapsulación le confiere estabilidad, mejor acción antibacteriana, permite un mezclado más homogéneo y menor pérdida del producto, además enmascara el sabor amargo de la tiamulina.

Indicaciones

Tratamiento, prevención y/o control de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tiamulina.

Aves: Enfermedad respiratoria crónica (micoplasmosis), saculitis aérea y sinusitis infecciosa, coriza, enfermedades ocasionadas por *Streptococcus* spp. y *Clostridium perfringens*.

Porcinos: Disentería, colitis porcina, ileitis, espiroquetosis, neumonía enzoótica y pleuroneumonía.

Dosis

Aves: Terapéutico: 625 - 1,250 g de TM alimento/diario por 3 - 5 días. **Postura:** promotor de crecimiento: 25 - 50 g de TM alimento. Preventivo: 75 - 125 g de TM alimento.

Porcinos: Terapéutico: 250 - 500 g de TM alimento/diario por 5 - 10 días.

Presentación

1 kg y 10 kg.



Micromutin® C80 Px

*Pleuromutilina microencapsulada
de última generación en alta concentración*



Composición

Cada 100 g contiene: Tiamulina como hidrogenofumarato microencapsulada 80 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Micromutin® C80 Px es un producto antibiótico muy eficaz en base a gránulos microencapsulados para la medicación del alimento de aves y cerdos. Provee 800 mg/g de actividad. La microencapsulación le confiere estabilidad, mejor acción antibacteriana, permite un mezclado más homogéneo y menor pérdida del producto, además enmascara el sabor amargo de la tiamulina. Su concentración garantiza ventajas económicas.

Indicaciones

Tratamiento, prevención y/o control de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tiamulina.

Aves: Enfermedad respiratoria crónica (micoplasmosis), saculitis aérea y sinusitis infecciosa, coriza, enfermedades ocasionadas por *Streptococcus* spp. y *Clostridium perfringens*.

Porcinos: Disentería y colitis porcina, ileitis, neumonía enzoótica y pleuroneumonía.

Dosis

Aves: Terapéutico: 312.5 - 625 g de TM alimento/diario por 3 - 5 días. **Postura:** promotor de crecimiento: 12.5 - 25 g de TM alimento. Preventivo: 37.5 - 62.5 g de TM alimento.

Porcinos: Terapéutico: 125 - 250 g de TM alimento/diario por 5 - 10 días.

Presentación

1 kg.



Porcimec® 2 Px

*Antiparasitario de amplio espectro
específico para cerdos*



Premezcla

Composición

Cada 100 g de Porcimec® 2 Px contiene: Ivermectina 1 g, fenbendazole 10 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Porcimec® 2 Px es una asociación antiparasitaria de amplio espectro para su administración en el alimento.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de infecciones parasitarias internas y externas en cerdos. Antihelmíntico endectocida de acción dual oral de amplio espectro con acción ovicida, larvicida y adulticida. Tratamiento contra infestaciones por artrópodos o nematodos debidas a: Vermes redondos gastrointestinales: *Ascaris suum* (adultos y L4), *Hyostrogylus rubidus* (adultos y L4), *Oesophagostomum* spp. (adultos y L4), *Strongyloides ransomi* (adultos)*. Vermes del pulmón: *Metastrongylus* spp. (adultos). Piojos: *Haematopinus suis*. Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

Dosis

Cerdos de engorde: hasta 40kg de p.v. – 200 g / TM alimento; de 40kg hasta 70kg de p.v. – 240 g / TM alimento; de 70kg de p.v. a más – 270 g / TM alimento.

Marranas: 400 g / TM alimento durante 7 días.

Presentación

15 g, 100 g, 1 kg, 10 kg y 20 kg.



Tygran® G100 Px

Antibiótico macrólido granulado al 10%



Composición

Cada 100 g contiene: Tilosina (fosfato) 10 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Tygran® G100 Px es un producto antibiótico para la medicación del alimento de aves y cerdos. Provee 100 mg/g de tilosina y es muy eficaz frente a diferentes enfermedades importantes en cerdos y aves de corral. Actúa contra microorganismos Gram+ y algunos Gram – y ofrece una buena actividad antimicoplásmica.

Indicaciones

Aves: Enfermedad respiratoria crónica (ERC), micoplasmosis, aerosaculitis, sinusitis infecciosa.

Porcinos: Neumonía micoplásmica, disentería porcina, enteropatía proliferativa (PPE) o ileitis.

Dosis

Aves: 8 - 10kg/TM de alimento (ERC: 2 - 5 kg/TM de alimento).

Porcinos: 400 g - 1 kg/TM de alimento.

Presentación

25 Kg.



Tylvax® Px

Antibiótico macrólido de última generación



Premezcla

Composición

Cada 100 g contiene: Tilvalosina* (tartrato) 5 g, excipientes c.s.p. 100 g.

*acetil-isovaleril tilosina

Descripción

Tylvax® Px es un producto antibiótico para la medicación del alimento de aves y cerdos. Provee 50 mg/g de actividad y es muy eficaz frente a diferentes enfermedades importantes en cerdos y aves de corral. Actúa contra microorganismos Gram+ y algunos Gram – y ofrece una excepcional actividad antimicoplásmica. Su eficacia es hasta diez veces mayor que la tilosina.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de las enfermedades respiratorias y entéricas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina.

Aves: Enfermedad respiratoria crónica (micoplasmosis), enteritis necrótica, enteritis bacterianas e infecciones por *Ornithobacterium rhinotracheale*.

Porcinos: Neumonía micoplásmica (enzoótica), ileítis, disentería y colitis porcina.

Dosis

Aves: Preventivo: 400 - 1 000 g/TM de alimento por 7 días. Terapéutico: 1 - 2 kg/TM de alimento por 7 - 10 días.

Porcinos: Preventivo: 400 - 1 000 g/TM de alimento por 21 días. Terapéutico: 1 - 2 kg/TM de alimento por 10 - 14 días.

Presentación

100 g, 1 kg y 20 kg.



Tylvax® C Px

*Asociación antibiótica sinérgica
tetraciclina - macrólido de última generación*



Premezcla



Composición

Cada 100 g contiene: Tilvalosina* (tartrato) 2 g, clortetraciclina (clorhidrato) 20 g, excipientes c.s.p. 100 g.

*acetil-isovaleril tilosina

Descripción

Tylvax® C Px es una asociación antibiótica para la medicación del alimento. Provee 20 mg/g de actividad de tilvalosina y 200mg/g de clortetraciclina y es muy eficaz frente a muchas enfermedades en cerdos y aves de corral (microorganismos Gram+, Gram – y excepcional actividad antimicoplásmica). La tilvalosina es diez veces más eficaz que la tilosina y la asociación con clortetraciclina potencia su efecto antibiótico y amplía su espectro.

Indicaciones

Tratamiento y prevención de enfermedades respiratorias, entéricas, mixtas, infecciones secundarias y para promover el crecimiento del animal.

Aves: Enfermedad respiratoria crónica (ERC), micoplasmosis, neumonías, saculitis aérea y sinusitis, enteritis necrótica asociada a *Clostridium perfringens*, enteritis bacteriana, *Ornithobacterium rhinotracheale*, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, onfalitis, sinovitis. Infecciones secundarias a virus y coccideas.

Porcinos: Micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica), ileítis, disentería porcina, colitis, rinitis atrófica, neumonías, pleuroneumonía, enfermedad de Glässer, sinovitis infecciosa, enteritis necrótica e infecciosa, salmonelosis, colibacilosis, abscesos cervicales y de las articulaciones.

Dosis

Aves: Preventivo: 1 kg/TM por 7 - 14 días. Terapéutico: 2.5 kg/TM por 7 - 10 días.

Porcinos: Preventivo: 1 - 2.5 kg /TM por 21 días. Terapéutico: 2.5 - 4 kg/TM por 7 - 14 días.

Presentación

100 g, 1 kg y 20 kg.



Valnemix® C100 Px

Valnemulina microencapsulada



Línea de
Microencapsulados
SMART-CAP



Premezcla

Composición

Cada 100g de contiene: Valnemulina (HCl) 10g; excipientes c.s.p 100g.

Descripción

Valnemix® C100 Px es un antibiótico a base de valnemulina, que pertenece al grupo de la pleuromutulina, actúa bloqueando la producción de proteínas por las bacterias, deteniendo el crecimiento de éstas. La valnemulina es activa frente a diversas bacterias que pueden afectar tanto los pulmones como al intestino.

Indicaciones

Para tratar o prevenir una serie de enfermedades bacterianas que afectan a los pulmones (como la neumonía enzoótica porcina) o al intestino (como la disentería porcina, la enteropatía proliferativa porcina o a la espirocetosis colónica porcina).

Dosis

Porcinos: Preventivo, signos clínicos de la espiroquetosis cólica porcina (colitis): 250 mg/kg de pienso por 7 días y hasta 4 semanas. Tratamiento, disentería porcina y de signos clínicos de enteropatía proliferativa porcina (ileítis): 750mg de Valnemix® C100 Px/kg de pienso por 7 días y hasta 4 semanas o hasta que los signos de la enfermedad desaparezcan. Para el tratamiento y prevención de neumonía enzoótica porcina: 2g de Valnemix® C100 Px/Kg de pienso por 2 semanas.

Presentación

1 kg y 20 kg.

Soluciones Orales

Diflovet® OS

Optiflor® OS

Pleurotil 250® OS

Tylo-Combisone® OS



Avivet®



Diflovet® OS

*Antibacteriano fluoroquinolónico
de tercera generación*



Solución
Oral

Composición

Cada 1 mL contiene: Difloxacin (como clorhidrato) 100 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

Descripción

Diflovet® OS es una solución oral que contiene difloxacin clorhidrato, una quinolona de tercera generación como sustancia activa. La difloxacin clorhidrato es un agente antibacteriano que actúa inhibiendo la enzima DNA girasa de las bacterias; posee un espectro muy amplio de actividad, siendo bactericida contra muchos patógenos Gram - y Gram +.

Indicaciones

Aves: Enfermedad respiratoria crónica (ERC) causada por cepas sensibles de *E. coli* y *M. gallisepticum* en pollos y pavos. Infecciones causadas por *Pasteurella multocida* en pavos. Entre los agentes susceptible se encuentran: *E. coli*, *Mycoplasma gallisepticum*, *M. meleagridis*, *M. synoviae*, *H. paragallinarum*, *E. rhusiopathiae*, *Staphylococcus aureus*, *Chlamydia psittaci*, *Pasteurella multocida* y *Salmonella* spp.

Dosis

Aves: Dosis diaria de 10 mg/kg de p.v., por lo menos durante 5 días.

Presentación

30 mL, 100 mL y 1L.



Optiflor® OS

Potente antibiótico de amplio espectro y bajo índice de resistencia a la inactivación bacteriana



Composición

Cada 100 mL contiene: Florfenicol 10 g, excipientes c.s.p 100 mL.

Descripción

Optiflor® OS es un antibiótico de amplio espectro, desarrollado a partir del tianfenicol, como una alternativa a la resistencia bacteriana y sin efectos secundarios en comparación con el cloranfenicol. Tiene un espectro más amplio que el cloranfenicol y es cerca de 100 veces más potente. Actúa contra microorganismos gram-positivos y gram-negativos, e incluso muestra un espectro superior a su análogo, tianfenicol.

Indicaciones

Tratamiento preventivo y terapéutico de infecciones debido a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus* spp., *Streptococcus* spp., *Actinobacillus pleuroneumoniae*, *Bordetella bronchiséptica*, *Escherichia coli*, *Clostridium* spp., *Ornitobacterium rhinotracheale*, *Staphylococcus* spp., *Proteus* spp., *Enterobacter* spp., *Shigella* spp., *Klebsiella* spp., *Lawsonia intracellularis* y *Salmonella choleraesuis* entre otras bacterias susceptibles al florfenicol.

Aves: Colibacilosis, pasteurelosis, saculitis e infecciones respiratorias bacterianas. Colisepticemia entre otras enfermedades gastrointestinales causadas por gérmenes susceptibles.

Porcinos: Síndrome respiratorio porcino, pleuroneumonía, rinitis atrófica; ileitis e infecciones gastrointestinales causadas por gérmenes susceptibles.

Dosis

Aves: 20 mg/Kg por 3-5 días, en la práctica 1L/1000 L agua (100 mg/L).

Porcinos: 10-20 mg/Kg por 5 días, en la práctica 1L-2L/1000 L agua (100-200 mg/L).

Presentación

30, 100, 250, 500 mL y 1L



Pleurotil® 250 OS

Antibacteriano macrólido de acción selectiva en los pulmones



Solución Oral



Solución Oral

Composición

Cada 100 mL contiene: Tilmicosina 25 g, excipientes c.s.p. 100 mL.

Descripción

Pleurotil® 250 OS en su forma de solución oral, es un antibiótico altamente liposoluble y parcialmente ligado a proteínas. Estas características le permiten pasar a través de las membranas celulares y distribuirse en el cuerpo del animal rápida y ampliamente. La tilmicosina posee amplio espectro con actividad muy significativa especialmente contra micoplasmas, bacterias Gram + y ciertas Gram -.

Indicaciones

Aves: Infecciones respiratorias causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida* y otros microorganismos sensibles a la tilmicosina.

Porcinos: Infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida*, *P. haemolytica*, *Mycoplasma* spp., *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Klebsiella* spp., *Haemophilus parasuis*, *Salmonella* spp., *Pseudomonas* spp., y *Streptococcus* spp., entre otros microorganismos susceptibles a la tilmicosina.

Dosis

Aves: 300 mL/1 000 L, durante 3 días.

Porcinos: 800 mL/1 000 L por 5 días en el agua de bebida.

Presentación

1 L.



Tylo-Combisone® OS

*Potente combinación sinérgica:
Macrólido + aminoglucósido*



Solución
Oral



Composición

Cada 100 mL contiene: Tilosina (tartrato) 15 g, gentamicina (sulfato) 6 g, excipientes c.s.p. 100 mL.

Descripción

Tylo-Combisone® OS es una asociación antibiótica sinérgica macrólido + aminoglucósido, ideal para el tratamiento y prevención de los procesos causados por microorganismos sensibles a la tilosina y gentamicina. La asociación actúa de manera aditiva.

La tilosina es un macrólido antibiótico de acción bacteriostática principalmente contra bacterias Gram (+) tales como *Campylobacter*, *Micoplasma*, *Pasteurella*, *Estafilococo*, *Streptococo* y *Treponema* spp. La gentamicina pertenece al grupo de aminoglucósidos y posee efecto bactericida principalmente contra bacterias Gram (-) tales como *E. coli*, *Klebsiella*, *Pasteurella* y *Salmonella* spp. La acción bactericida se basa en la inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas.

Indicaciones

Indicado en casos de enfermedad respiratoria crónica (ERC), neumonías, bronconeumonías, enteritis, gastroenteritis, diarrea blanca, disentería, micoplasmosis, artritis, mastitis-metritis-agalactia (MMA), entre otros.

Dosis

Aves: 1 L / 2 000 L de agua, 1 a 2 veces durante 3 – 5 días.

Porcinos: 1 L / 2 000 L de agua, 1 a 2 veces durante 3 – 5 días.

Presentación

30mL, 100mL, 250mL, 500 mL, 1L.

Otros

Aquacid Cu OS

No-Fly

Sequent® PSP

Vácidos

Virodine® S

Viroguard® 6



Aquacid Cu OS

Acidificante en base a ácidos orgánicos y cobre



Composición

Cada 100 mL contiene: Ácido fórmico 23 g, ácido acético 23 g, ácido propiónico 4 g, ácido láctico 15 g, sulfato de cobre 0.50 g, agua c.s.p 100 mL.

Descripción

Aquacid Cu OS es un agente acidificante, combinación balanceada, sinérgica y altamente concentrada de ácidos orgánicos y cobre. Ejerce su acción mediante una rápida reducción del pH en el agua de bebida y no afecta el consumo del agua. La acidificación del agua -y con ello el medio intestinal-, inhibe el crecimiento de bacterias patógenas, mohos y levaduras y mejora la digestión de las proteínas. El cobre juega un papel importante en diferentes procesos metabólicos y tiene, además, un efecto bactericida. Aquacid Cu OS ofrece un medio óptimo para una adecuada digestión e inhibe el desarrollo de bacterias patógenas en el agua e intestino de los animales.

Indicaciones

Como preventivo, cuando se requiera acidificar el agua -y el tracto intestinal- y con ello, instalar un programa de mejora de la calidad del agua, incrementando la disponibilidad de nutrientes, la salud intestinal y la preservación del agua y alimento húmedo. Cuando se requiera regular el pH de aguas muy alcalinas dentro del rango óptimo para el efecto antibacteriano de la clorinación (pH 7.2-7.8). Indicaciones específicas incluyen: problemas digestivos, luego de la vacunación, situaciones de estrés, luego del uso de antibióticos, cama húmeda, alimentación deficiente, entre otras situaciones. Su uso puede, mejorar el índice de conversión, la calidad de la cáscara del huevo, la fertilidad, el porcentaje de postura, el índice de eclosión y el retraso en el crecimiento.

Dosis

Aves y cerdos: vía oral en el agua de bebida a razón de 1 - 2 litros por 1000 litros de agua. Dependiendo de las circunstancias, la dosificación puede aumentarse y el periodo de administración puede extenderse. La dosificación también es directamente proporcional a la dureza del agua potable.

Presentaciones

1L, 12L y 20L.



No-Fly

*Cebo mosquicida neonicotinoide
con efecto atrayente y amargante*

Otros

Composición

Cada 100 g contiene: Imidacloprid 0.5 g, z-9 tricoseno 0.1 g, benzoato de denatonio 0.01 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción e indicaciones

No-Fly es un mosquicida en cebo granular, que elimina todos los tipos de mosca actuando de modo eficaz y resolutivo. Formulado con ingredientes específicos: feromonas y coformulantes alimentarios que ejercen una atracción irresistible y una acción letal sobre las moscas. Altamente efectivo contra insectos, muy seguro para animales domésticos y el ser humano. Usar sobre superficies y áreas en interiores o exteriores donde se encuentren los insectos. No-Fly es efectivo contra la mosca común: *Musca doméstica*; mosca del estiércol: *Scatophaga stercoraria*; mosca azul: *Calliphora vomitoria*; mosca de los establos: *Stomoxys calcitrans*; mosquito común: *Culex pipiens*, entre otros.

Dosificación y uso

Esparcido: Colocar No-Fly en una superficie plana, 20 g/10 m² humedecidos en las áreas periféricas a las instalaciones para atraer las moscas del interior de casetas y corrales. Rehumedezca de forma regular y reponga conforme deterioro y/o consumo. **Pulverización:** Disolver 100 g en 100 mL de agua por cada 50 m². Reposar por 15-30 minutos y pulverizar el área, o de manera focalizada sobre las superficies donde se posan los insectos. Cerrar el galpón durante y después de la aplicación por mínimo 30 minutos. **Pintado:** Disolver 100 g en 75 mL de agua. Reposar durante 20 minutos. Aplicar con una brocha en paredes, puertas y/o superficies donde se posen los insectos. **Trampas:** Disolver 100 g de producto en 75 mL de agua para impregnar paneles de madera o cartón con la solución y colgarlos sobre los lugares frecuentados por los insectos. En todos los casos, aplicar el producto en épocas de proliferación de insectos hasta obtener una desinsectación total.

Presentación

Caja x 25 unidades x 20 g, talquera 200 g y 1Kg.



Sequent® PSP

*Insecticida de origen natural de acción única
y efecto prolongado*



Composición

Cada 100 mL contiene: Spinosad (espinosina A y espinosina D) 480 g, excipientes c.s.p 100 mL

Descripción

Sequent® PSP es un insecticida de origen natural, para uso en instalaciones pecuarias o en aves. Su formulación novedosa en base a spinosad, ejerce una acción dual sobre el insecto a través de la unión de dos receptores únicos y selectivos en el insecto, por lo que no presenta resistencia cruzada con ningún otro compuesto insecticida existente. El spinosad es una neurotoxina compuesta por una mezcla de las espinosinas A y D, las cuales son compuestos tetracíclicos de macrólidos que actúan sobre los receptores post-sinápticos de la acetilcolina nicotínica y los receptores GABA.

Indicaciones

Control de moscas domésticas y sus larvas, moscas de establo (*Musca domestica* y *Stomoxys calcitrans*), mosquitos de los galpones (*Fannia canicularis*), escarabajo del estiércol o escarabajo negro (*Alphitobius diaperinus*) y escarabajo del cuero (*Dermestes* spp.); dentro y alrededor de las instalaciones pecuarias. Control de ácaros de las aves: *Dermanyssus gallinae* (ácaro rojo) y *Ornithonyssus Bursa* (coruco) *Ornithonyssus sylviarum* (ornitoso tropical), dentro y alrededor de las instalaciones pecuarias, así con en las mismas aves.

Dosis

Aves: Presencia de ácaros: Diluir 30 mL en 14 L de agua. Aplicar no más de 4 L por 100 aves para asegurar una cobertura adecuada. Reaplicar cada 14 días o cuando sea necesario. Una primera aplicación de Sequent® PSP y en infestaciones graves, usar 60 mL/7 L de agua.

Instalaciones con presencia de: Ácaros: En una primera aplicación de Sequent® PSP o en infestaciones graves, usar 60 mL/7 L de agua. Posteriores aplicaciones o cuando los niveles de infestación son bajos: 30 mL/7 L de agua. Por su nivel de seguridad puede aplicarse en presencia de aves e incluso en huevos para consumo humano. **Escarabajos:** 30 mL/7 L de agua (para pulverizar 250m²); para el tratamiento del suelo, sobretodo alrededor y bajo los comederos y bebederos, paredes y vigas de apoyo. En caso de infestaciones severas duplicar la dosis. **Moscas y mosquitos:** 30 mL/18 L de agua (para pulverizar 500 m²); para el tratamiento de las zonas de descanso de las moscas, con especial atención a las paredes laterales, zonas de cada extremo del edificio, partes superiores de las jambas de las puertas y las vigas transversales. Aplicar temprano por la mañana cuando las moscas están descansando. En caso de infestaciones severas duplicar la dosis.

Presentación

Frasco x 30 y 500 mL



Vácidos

*Neutralizador de cloro, buffer
y colorante de agua para solución
vacunal para aves*



Otros

Composición

Una tableta contiene: Tiosulfato de sodio 1.51 g, EDTA disódico 4.12 g, excipientes c.s.p. 1 tableta.

Descripción

Vácidos es un neutralizador de cloro, buffer, quelante y colorante de agua para solución vacunal para aves. No contiene polvo de leche descremada u otros ingredientes de origen animal. El tinte azul está aprobado como categoría alimento.

Indicaciones

Suavizante de agua. Hace el agua dura apta para la bebida. Fuerte neutralizador de cloro y agente neutralizante: mantiene el pH ideal de 5.4 a 6.5 para dosificación de vacunas, medicinas y probióticos. Elimina los metales pesados contaminantes del agua como hierro, plomo, arsénico, mercurio, etc; para hacer el agua de bebida más segura. Controla la entrega de solución vacunal dentro de la red de agua y pinta el pico de las aves que han ingerido el agua.

Dosificación y uso

Una tableta por cada 100 L de agua. Preparar el volumen de agua adecuado para la vacunación, añadir 1 tableta por cada 100 L de agua, esperar 10 minutos para una completa neutralización del cloro, luego homogenizar con una agitador plástico. Diluir la vacuna abriendo el frasco bajo la superficie del agua, distribuir la vacuna y añadir nuevamente una tableta en el tanque después de la vacunación, en un volumen de agua equivalente a 2 horas de consumo de las aves.

Presentación

Envase x 100 tabletas / Envase x 50 tabletas.



Virodine® S

*Desinfectante sinérgico, balanceado y estabilizado.
Microbicida de amplio espectro*

Composición

Cada 100 g contiene: Peroximonosulfato de potasio 53 g, dodecibenceno sulfonato sódico 10 g, ácido sulfámico 6 g, cloruro de sodio 3 g, excipientes c.s.p 100 g

Descripción

Virodine® S es un desinfectante formulado con ácidos orgánicos, peróxidos, surfactantes y un amortiguador inorgánico estabilizado. Posee amplio espectro, es efectivo contra microorganismos patógenos que causan enfermedades en aves, cerdos y animales domésticos.

Indicaciones

Indicado para la desinfección de instalaciones, superficies, equipos, estructuras, huevos, vehículos, sistemas de distribución de agua y aire; rodiluvios, pediluvios, sistemas de distribución de agua y áreas con presencia de animales. Indicado para eliminar: **Bacterias:** *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bacillus cereus*, *Campylobacter jejuni*, *Clostridium perfringens*, *E. coli*, *Klebsiella pneumonia*, *Mycoplasma gallisepticum*, *M. hyopneumonia*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomona aeruginosa*, *Salmonella enterica*, *S. typhimurium*, *Shigella sonnei*, *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*, *Streptococcus pyogenes*, *S. suis*. *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bacillus cereus*, *Campylobacter jejuni*, *Clostridium perfringens*, *E. coli*, *Klebsiella pneumonia*, *Mycoplasma gallisepticum*, *M. hyopneumonia*, *Pasteurella multocida*, *Pseudomona aeruginosa*, *Salmonella enterica*, *S. typhimurium*, *Shigella sonnei*, *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*, *Streptococcus pyogenes*, *S. suis*. **Virus:** Virus de influenza aviar, virus laringotraqueitis aviar, virus estomatitis vesicular, virus de Newcastle. **Hongos:** *Trichophyton mentagrophytes*. **Esporas y algas.**

Dosificación y uso

Desinfección de rutina de superficies, madera y concreto; limpieza de rutina y desinfección de equipo portátil: 1:100/1:200 (5-10 g/L de agua), usar 300 mL/m². Desinfección de pediluvios y rodiluvios 1:100 (10 g/L de agua). Desinfección para sistemas de distribución de agua: desinfección terminal 1:200 – 1:100 (0.5% – 1%), desinfección continua 1:1000 (0.1%). Desinfección de aérea por nebulización: 1:200 (10 g/L de agua), usar 1 L/100 m³. Desinfección de aérea con presencia de animales por termonebulización: 1:200 (10 g/L de agua), usar 1 L/100 m³. Para desinfección de agua potable, 1:1000 (0.5 g/L).

Presentación

50 g, 500 g, 1 kg y 5 kg.



Viroguard® 6

*Asociación desinfectante sinérgica,
concentrada de amplio espectro y
larga acción*

Otros

Composición

Cada 1 mL contiene: Cloruro de benzalconio 170.6 mg, cloruro de didecil dimetil amonio 78 mg, glutaraldehído 107.25 mg, alcohol isopropílico 200 mg, aceite de pino 50 mg, excipientes 1 mL.

Descripción

Viroguard® 6 es un potente desinfectante en fórmula sinérgica y larga acción residual, que incluye un aldehído moderno y seguro, 2 amonio cuaternarios (uno de cadena simple y otro de doble cadena), un alcohol (isopropanol) y aceite de pino.

Indicaciones

Es efectivo para la prevención y control de brotes de las principales enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias u hongos (incluyendo esporas), entre ellos los agentes causantes de la fiebre porcina clásica, fiebre aftosa, influenza aviar, colibacilosis, micoplasmosis, etc. Gracias a su sofisticada formulación, puede ser utilizado a diluciones extremadamente bajas.

Dosificación y uso

Galpones: Limpiar y lavar la superficie a desinfectar. Luego del enjuague aplicar Viroguard® 6 a dosis de 0.25 - 0.5% (1:400 - 1:200) (1 L de la preparación/4m²) por rociado. **Vehículos:** Limpiar y lavar los vehículos. Luego del enjuague aplicar Viroguard® 6 a dosis de 0.25 - 0.5% (1:400 - 1:200) (1L de la preparación/ 4m²) por rociado. **Llantas:** sumergir a dosis de 1%. **Almacenes y molinos:** Limpiar y lavar las superficies. Luego del enjuague aplicar Viroguard® 6 a dosis de 0.25 - 0.5 % (1:400 - 1:200). Enjuague transcurridos 15 minutos de tiempo de contacto.

Presentación

1L, 5L, 10L, 20L y 200 L.





Nutrición de Resultados

Nutrovet® propone alternativas nutricionales de alta performance con formulaciones únicas para proveer nutrimentos y suplementar la dieta, enfocándose en el balance necesario para una adecuada promoción de la inmunidad, la protección de la integridad intestinal y la optimización del crecimiento.





Soluciones Orales

Aminoplex® Forte OS

ChickBooster® con Nucleótidos OS

ChickVit® ADE+C OS

ChickVit® B OS

ChickVit® ESe OS

Hematofos B12® AC OS

Hepaviar® OS

Vetonic® con Nucleótidos OS



Aminoplex® Forte OS

*Suplemento nutricional con aminoácidos
en alta concentración*



Solución
Oral



Línea
Producción



Composición

Cada 100 mL contienen: L-Histidina (clorhidrato) 34 mg; DL-Metionina 34 mg; L-Triptofano 34 mg; L-Cisteína (clorhidrato) 34 mg; L-Treonina 68 mg; L-Isoleucina 68 mg; L-Arginina (clorhidrato) 85 mg; L-Fenilalanina 102 mg; L-Valina 170 mg; L-Lisina (clorhidrato) 102 mg; L-Leucina 136 mg; Glutamato monosódico 136 mg; vit. B1 (tiamina clorhidrato) 11 mg; vit. B2 (riboflavina fosfato sódico) 4 mg; vit. B6 (piridoxina clorhidrato) 10 mg; vit. B12 (cianocobalamina) 5 ug; nicotinamida (niacinamida) 150 mg; dextrosa monohidrato 5 g; cloruro de calcio (dihidrato) 15 mg; cloruro de potasio 20 mg; sulfato de magnesio (anhidro) 20 mg; acetato de sodio trihidratado 250 mg, excipientes c.s.p. 100 mL.

Descripción

Aminoplex® Forte OS está compuesto por una importante cantidad de aminoácidos, electrolitos, vitaminas del complejo B y dextrosa (de rápida absorción y asimilación) para una rehidratación y recuperación inmediata. Su fórmula completa y balanceada restaura, rápidamente el equilibrio metabólico en animales debilitados, convalecientes o bajo tensión excesiva. La amplia gama de aminoácidos que posee, tiende a subsanar la deficiencia de proteínas y otros aminoácidos escasos en desnutrición animal y anemias; representan también, un papel importante en el metabolismo de las grasas dentro del hígado. Aminoplex Forte® OS conjuga compuestos que resultan esenciales para el crecimiento y hematopoyesis normales, así como para la restitución de las células epiteliales y el mantenimiento adecuado de todo el tejido nervioso y hepático.

Indicaciones

Suplemento nutricional para reponer rápida y eficazmente carencias proteicas como resultado de dietas insuficientes en aminoácidos. Como soporte durante el tratamiento de estados agudos de convalecencia, animales debilitados o sometidos a esfuerzos intensos, agotamiento físico, sobre entrenamiento, estrés, shock, enfermedades crónicas, hemorragias, parasitosis, intoxicaciones y como terapia de apoyo en casos de deshidratación severa por vómitos o diarreas de cualquier origen. Como preventivo y coadyuvante en casos de anomalías músculo esqueléticas, deficiencias en plumaje, dermatitis, hepatosis dietética, anemia, anorexia, síndrome de mala absorción, crecimiento retrasado.

Dosis

Aves: 1 L / 1 000 a 2 000 L de agua.

Porcinos: 1 L / 500 a 1 000 L de agua.

Presentación

1 L y 20 L.



ChickBooster® con Nucleótidos OS

Bioestimulante integral en fórmula balanceada en base a vitaminas, aminoácidos, minerales, electrolitos, ácidos grasos esenciales. Único con Nucleotix®



Solución
Oral



Línea
Producción



Nucleotix®



Solución Oral

Composición

Cada 1 000 mL contiene: vit. A (retinol palmitato) 2 500 000 UI, vit. D3 (colecalciferol) 500 000 UI, vit. E (alfa tocoferil acetato) 3 750 mg, vit. K3 (menadiona sodio bisulfito) 250 mg, vit. B1 (tiamina clorhidrato) 3 500 mg, vit. B2 (riboflavina 5 sodio fosfato) 4 000 mg, vit. B3 (nicotinamida) 10 000 mg, vit. B5 (pantotenato de calcio) 15 000 mg, vit. B6 (piridoxina clorhidrato) 2 000 mg, vit. B7 (biotina) 2 mg, vit. B9 (ácido fólico) 250 mg, vit. B12 (cianocobalamina) 10 mg, vit. B15 (pangamato sódico) 1 mg, vit. BH (inositol) 3 mg, DL-Metionina 5 000 mg, L-Lisina (clorhidrato) 2 500 mg, L-Treonina 500 mg, L-Triptófano 75 mg, L-Histidina (clorhidrato) 900 mg, L-Arginina (clorhidrato) 490 mg, L-Ácido aspártico 1 450 mg, L-Serina 680 mg, ácido glutámico 1 160 mg, L-Prolina 510 mg, glicina 575 mg, L-Alanina 975 mg, L-Cisteína (clorhidrato) 150 mg, L-Valina 1 100 mg, L-Leucina 1 150 mg, L-Isoleucina 125 mg, L-Tirosina 340 mg, L-Fenilalanina 810 mg, nucleótidos 5 000 mg, ácidos grasos esenciales 500 mg, selenito de sodio 125 mg, yoduro de potasio 500 mg, cobalto (gluconato de cobalto) 500 mg, cobre (cobre-edetato) 200 mg, manganeso (manganeso-edetato) 1 000 mg, zinc (zinc-edetato) 3 000 mg, hierro (hierro-edetato) 210 mg, cloruro de sodio 10 000 mg, cloruro de potasio 8 250 mg, sulfato de magnesio 455 mg, ácido cítrico 3 000 mg, excipientes c.s.p. 1 000 mL.

Indicaciones

Suplemento nutricional recomendado como promotor de crecimiento y como coadyuvante en todas las enfermedades infecciosas, intoxicaciones, convalecencias, cambios bruscos de temperaturas, pre y pos vacunaciones, deshidratación y situaciones de estrés. Cuando exista aporte insuficiente de vitaminas y minerales en el alimento. La formulación exclusiva a base de nucleótidos -Nucleotix®- promueve la división y regeneración celular, optimiza las funciones biológicas, mejora la respuesta del sistema inmune y potencia el desempeño productivo al mejorar la conversión alimenticia.

Dosis

Aves: 1 a 2 L/1 000 L de agua.

Presentación

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.



ChickVit® ADE + C OS

Asociación microemulsionada de vitaminas A, D y E adicionada con vitamina C



Solución
Oral



Línea
Producción



Composición

Cada 100 mL contiene: vit. A (retinol palmitato) 5 000 000 U.I., vit. D3 (colecalfierol) 1 000 000 U.I., vit. E (como alfa tocoferol acetato) 2 000 mg, vit. C (como ascorbato de sodio) 10 000 mg, excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones

Indicado en la prevención de la deficiencia de las vitaminas asociadas a la fórmula. Mejora índices reproductivos y también productivos, como el índice de conversión alimenticia. Posee acción antioxidante e inmunoestimulante, favorece al crecimiento y mantenimiento del sistema óseo y esquelético. Muy útil para la prevención y/o tratamiento de estrés por vacunación, enfermedades, transporte, alta humedad, cambios bruscos de temperatura y estrés calórico. Como coadyuvante en tratamientos antihelmínticos, anticoccidiales y antiinfecciosos.

Dosis

Aves: 1 L por 4 000 L de agua de bebida.

Porcinos: 100 mL por 400 L de agua de bebida. Directamente sin diluir: 0.5 - 1 mL por lechón.

Presentación

30 mL, 100 mL, 1L, 5L y 20L.



ChickVit® B OS

*Asociación de todas las vitaminas del Complejo B
adicionada con aminoácidos esenciales*



Solución
Oral



Línea
Producción



Solución Oral

Composición

Cada 100 mL contiene: vit. B1 (tiamina clorhidrato) 300 mg, vit. B2 (riboflavina fosfato sódico) 600 mg, vit. B3 (nicotinamida) 4 000 mg, vit. B5 (D-pantenol) 1 000 mg, vit. B6 (piridoxina clorhidrato) 400 mg, vit. B7 (biotina) 15 mg, vit. B9 (ácido fólico) 50 mg, vit. B12 (cianocobalamina) 2 mg, vit. B15 (pangamato sódico) 50 mg, vit. BH (inositol) 100 mg, cloruro de colina 2 000 mg, L-Lisina (L-Lisina clorhidrato) 1 000 mg, DL-Metionina 500 mg, excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones

Prevención y tratamiento de deficiencias de todas las vitaminas del complejo B. Recomendado para animales jóvenes en crecimiento y durante los períodos de gestación, lactancia, producción y convalecencias de enfermedades, así como situaciones estresantes causadas por infecciones bacterianas, virales y parasitarias. En casos de debilidad general, polineuritis, claudicación, parálisis y durante procesos anémicos. Después de tratamientos con antibióticos, sulfas o vacunaciones. Coadyuvante de hepatopatías, intoxicaciones, trastornos digestivos y cambios en el régimen alimenticio. Bajas en el crecimiento y la conversión alimenticia.

Dosis

Aves: 1 L por 1 000 - 2 000 L de agua de bebida.

Porcinos: 100 mL por 100 - 200 L de agua de bebida. Directamente sin diluir: 1 - 2 mL por lechón.

Presentación

30 mL, 1L, 5 L y 20 L.



ChickVit® ESe OS

Asociación microemulsionada y balanceada de vitamina E y selenio orgánico quelatado



Composición

Cada 100 mL contiene: vit. E (como alfa tocoferol acetato) 5 000 mg; selenio (como selenio-AHM) 50 mg; DL-Metionina 1 000 mg; excipientes c.s.p. 100 mL.

Indicaciones

Prevención y tratamiento de deficiencias en vitamina E y Selenio. Posee efecto antioxidante y estimulante del organismo y del sistema inmune. Apropiado para periodos de estrés por vacunaciones, estrés calórico o manejo en general. Para resolver problemas reproductivos por deficiencias vitamínicas en diferentes especies, específicamente en aves para prevenir la eclosión reducida de los huevos. Indicado en casos de encefalomalacia, distrofia muscular, diátesis exudativa y como prevención de intoxicaciones por hierro en lechones.

Dosis

Aves: 1 L por 2 000 L de agua de bebida; pollitos (< 21 días): 1 L por 500 - 1 000 L de agua de bebida durante 3 - 5 días.
Porcinos: 100 mL por 200 L de agua de bebida. Directamente sin diluir: Lechones: 1 - 2 mL por lechón.

Presentación

30 mL, 1L, 5 L y 20 L.



Hematofos B12[®] AC OS

Asociación reconstituyente de vitaminas del Complejo B, minerales, aminoácidos y adicionado con fósforo.



Solución Oral

Composición

Cada 1 000 mL contiene: DL-Metionina 10 000 mg, L-Histidina 5 000 mg, L-Triptófano 2 500 mg, vit. B12 (cianocobalamina) 11 mg, vit. B2 (riboflavina fosfato sódico) 2 000 mg, vit. B3 (nicotinamida) 50 000 mg, vit. B6 (piridoxina clorhidrato) 10 000 mg, citrato de hierro amoniacal verde 20 000 mg, cobalto (acetato de cobalto tetrahidrato) 120 mg, glicerofosfato sódico 10 000 mg, excipientes c.s.p. 1 000 mL.

Indicaciones

Reconstituyente general frente a cuadros de enflaquecimiento, debilidad, situaciones de estrés, inapetencia, fracturas, intoxicaciones, agotamiento sexual, caída de plumas y frente a todo tipo de anemias, etc. Potente estimulante del apetito y del crecimiento, aumenta la producción y promueve las funciones biológicas.

Dosis

Aves: Pollos de engorde: de 0.5 - 1 L por cada 200 L de agua de bebida durante los primeros 3 días a la recepción del lote y durante los 2 primeros días al iniciar la cuarta semana. Crianza ornamental y casera: 5 - 10 gotas para 100 mL de agua de bebida.

Porcinos: 5 mL/20 kg p.v. Dosis diluida: Lechones (maternidad): 125 mL/100 L de agua. Lechones (post destete): 50 mL/100 L de agua. Desarrollo (<50 kg): 80 mL/100 L de agua. Engorde (>50 kg): 125 mL / 100 L de agua. Cerdas gestantes: 170 mL/100 L de agua. Cerdas lactantes: 100 mL/100 L de agua.

Presentación

30 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L y 5 L.



Hepaviar® OS

*Asociación balanceada hepatoprotectora,
lipotrópica y desintoxicante*



Solución
Oral



Línea
Producción



Composición

Cada 100 mL contiene: L-Carnitina HCl 5 000 mg, DL-Metionina 2 000 mg, cloruro de colina 7 500 mg, betaína clorhidrato 1 000 mg, L-Lisina HCl 2 000 mg, N-Acetil-L-Metionina 1 000 mg*, magnesio sulfato 1 010 mg, sorbitol 20 000 mg, silimarina 2 000 mg, extracto de alcachofa 2 000 mg, Otros excipientes c.s.p. 100 mL.

*Para un total de proteínas 12 206 mg.

Indicaciones

Dietas con elevado contenido energético, intoxicaciones, como adyuvante en el tratamiento o prevención de síndrome de Hígado Graso (lipidosis hepática), tratamiento de micotoxicosis, preparación de aves para muda forzada, mejorador del apetito y conversión alimenticia. Hepatitis agudas y crónicas, síndrome cólico, estados infecciosos y disfunciones gastrointestinales. Coadyuvante en situaciones que comprometan un funcionamiento hepático adecuado.

Dosis

Aves: Preventivo: En ponedoras comerciales: entre las 28 y 40 semanas, cada 4 semanas por 3 - 5 días consecutivos y en pollos de engorde: 3 - 5 días con el cambio de alimento del último día del programa: 1L/2 000 L de agua. Tratamiento: 1 L/1 000 - 1 500 L de agua de bebida, durante 5 a 7 días.

Porcinos: 1 L/1 000 - 2 000 L de agua.

Presentación

30mL, 100 mL, 250 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

Vetonic® con Nucleótidos OS

Bioestimulante integral en fórmula balanceada en base a vitaminas, aminoácidos, minerales, electrolitos, ácidos grasos esenciales. Único con Nucleotix®



Solución Oral

Composición

Cada 1 000 mL contiene: vit. A (retinol palmitato) 2 500 000 UI, vit. D3 (colecalfiferol) 500 000 UI, vit. E (alfa tocoferil acetato) 3 750 mg, vit. K3 (menadiona sodio bisulfito) 250 mg, vit. B1 (tiamina clorhidrato) 3 500 mg, vit. B2 (riboflavina 5 sodio fosfato) 4 000 mg, vit. B3 (nicotinamida) 10 000 mg, vit. B5 (pantotenato de calcio) 15 000 mg, vit. B6 (piridoxina clorhidrato) 2 000 mg, vit. B7 (biotina) 2 mg, vit. B9 (ácido fólico) 250 mg, vit. B12 (cianocobalamina) 10 mg, vit. B15 (pangamato sódico) 1 mg, vit. BH (inositol) 3 mg, DL-Metionina 5 000 mg, L-Lisina (clorhidrato) 2 500 mg, L-Treonina 500 mg, L-Triptófano 75 mg, L-Histidina (clorhidrato) 900 mg, L-Arginina (clorhidrato) 490 mg, L-Ácido aspártico 1 450 mg, L-Serina 680 mg, ácido glutámico 1 160 mg, L-Prolina 510 mg, glicina 575 mg, L-Alanina 975 mg, L-Cisteína (clorhidrato) 150 mg, L-Valina 1 100 mg, L-Leucina 1 150 mg, L-Isoleucina 125 mg, L-Tirosina 340 mg, L-Fenilalanina 810 mg, nucleótidos 5 000 mg, ácidos grasos esenciales 500 mg, selenito de sodio 125 mg, yoduro de potasio 500 mg, cobalto (gluconato de cobalto) 500 mg, cobre (cobre-edetato) 200 mg, manganeso (manganeso-edetato) 1 000 mg, zinc (zinc-edetato) 3 000 mg, hierro (hierro-edetato) 210 mg, cloruro de sodio 10 000 mg, cloruro de potasio 8 250 mg, sulfato de magnesio 455 mg, ácido cítrico 3 000 mg, excipientes c.s.p. 1 000 mL.

Indicaciones

Suplemento nutricional recomendado como promotor de crecimiento y como coadyuvante en todas las enfermedades infecciosas, intoxicaciones, convalecencias, cambios bruscos de temperaturas, pre y pos vacunaciones, deshidratación y situaciones de estrés. Cuando exista aporte insuficiente de vitaminas y minerales en el alimento. La formulación exclusiva a base de nucleótidos -Nucleotix®- promueve la división y regeneración celular, optimiza las funciones biológicas, mejora la respuesta del sistema inmune y potencia el desempeño productivo al mejorar la conversión alimenticia.

Dosis

Porcinos: 1 a 2 L/1 000 L de agua (1 a 2 mL/L de agua).

Presentación

30 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L y 20 L.

Polvos Solubles

ChickLyte® WS

Lysozym® 100

ProBiolyte® WS

Vequinax® WS





ChickLyte® WS

Asociación re-hidratante energético-electrolítica con probióticos y glicina



Polvo Soluble



Línea Producción



Hipersoluble



Polvo Soluble

Composición

Cada 100 g contiene: Cloruro de sodio 11 000 mg, cloruro de potasio 4 000 mg, fosfato sódico 5 000 mg, sulfato de magnesio anhidro 800 mg, hierro (como hierro-AHM*) 334 mg, manganeso (como manganeso-AHM*) 1 576 mg, cobre (como cobre-AHM*) 500 mg, zinc (como zinc-AHM*) 431 mg, dextrosa monohidrato 56 000 mg, citrato trisódico dihidrato 200 mg, ácido cítrico anhidro 5 000 mg, glicina 8 000 mg, probióticos (**) 3 mg, maltodextrina 3 000 mg, lactosa monohidrato c.s.p. 100 g. *AHM: análogo de hidroximetionina; ** 12 cepas de probióticos.

(*) mezcla de probióticos: *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus*, *Enterococcus faecium*, *Aspergillus oryzae*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Bacillus coagulans*.

Descripción

ChickLyte® WS es una asociación balanceada de electrolitos fácilmente asimilables y sales minerales orgánicas queladas, glucosa y glicina, diseñada para contrarrestar los efectos de la deshidratación. Repone los electrolitos y mejora el equilibrio ácido-base que se pierde en diversos trastornos metabólicos a causa de la falta de agua. La glicina aumenta la absorción de glucosa y los probióticos reponen la flora intestinal y protegen el tracto de la proliferación de bacterias patógenas.

Indicaciones

Tratamiento de los cuadros de deshidratación, desequilibrio electrolítico y carencia energética a causa de pérdidas excesivas de fluidos por diarrea, vómitos, sudoración, enfermedades, temperaturas altas, respiración u orina en exceso. Como preventivo y soporte en diarreas, convalecencia, post vacunaciones, despique y recepción de aves, estrés de transporte y especialmente en estrés calórico.

Dosis

Aves: 1 kg/1 000 L de agua.

Porcinos: 1 kg/750 L de agua.

Presentación

15 g, 100 g y 1 kg.



Lysozym® 100

*Promotor de crecimiento.
No antibiótico*



Polvo
Soluble



Línea
Producción



Composición

Cada 100 g contiene: Lisozima 10 g (equivalente a 5 000 000 UI), excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Lysozym® 100 es una preparación de lisozima purificada y modificada por biotecnología para ser administrada mediante agua de bebida o en el alimento. La lisozima facilita la fagocitosis e hidroliza la pared bacteriana y mejora la salud de los tejidos intestinales. Promueve la colonización de bacterias benéficas y reduce la descarga de enteropatógenos. Como promotor, reemplaza el uso de antibióticos con resultados similares o superiores. Junto a antibioterapia, reduce la dosis de los mismos.

Indicaciones

Para mejorar la digestibilidad y absorción de nutrientes, fomentando la ganancia diaria de peso y mejorando la conversión alimenticia. Aumenta la calidad proteica y reduce el porcentaje de grasa en las carcasas. Mantiene la salud e inmunidad general y gastrointestinal, disminuye la descarga patógena, previene procesos diarreicos y brinda soporte en tratamientos antibióticos.

Dosis

Aves: Inicio: 80 - 150 g de Lysozym® 100/2 000 L agua o por tonelada de alimento, crecimiento: 60 - 80 g de Lysozym® 100/2 000 L agua o por tonelada de alimento, acabado: 50 - 60 g de Lysozym® 100/2 000 L agua o por tonelada de alimento, postura, reproductoras y competencia: 80 - 100 g de Lysozym® 100/2 000 L agua o por tonelada de alimento.

Porcinos: Lechones: 100 - 150 g de Lysozym® 100/2 000 L agua o por tonelada de alimento, al destete: 150 - 300 g de Lysozym® 100/2 000 L agua o por tonelada de alimento, crecimiento y acabado: 70 - 100 g de Lysozym® 100/2 000 L agua o por tonelada de alimento, cerdas en lactación: 100 - 150 g de Lysozym® 100/2 000 L agua o por tonelada de alimento.

Presentación

15 g y 1 kg.



ProBiolyte® WS

Complejo multielemental de vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos y probióticos



Polvo Soluble



Línea Producción



Polvo Soluble

Composición

Cada 100 g contiene: vit. A 1 000 000 UI, vit. D3 250 000 UI, vit. E 500 mg, vit. K3 450 mg, vit. B1 110 mg, vit. B2 150 mg, vit. B3 1 000 mg, vit. B5 550 mg, vit. B6 75 mg, vit. B7 40 mg, vit. B9 20 mg, vit. B12 1.2 mg, vit. B15 20 mg, vit. BH 50 mg, vit. C 100 mg, ácido aspártico 191.3 mg, ácido glutámico 330 mg, alanina 84 mg, arginina 46.5 mg, cisteína 42.8 mg, fenilalanina 49.5 mg, glicina 413.3 mg, histidina 42 mg, isoleucina 111.8 mg, leucina 177.8 mg, lisina 1 500 mg, metionina 1 000 mg, prolina 100.5 mg, serina 330 mg, tirosina 39.8 mg, treonina 126 mg, triptófano 31.5 mg, valina 106.5 mg, ácido cítrico anhidro 5 000 mg, cloruro de sodio 5 000 mg, cloruro de potasio 8 750 mg, gluconato de cobalto 32.8 mg, cobre-edetato 187.5 mg, cromo-metionina 0.1 mg, hierro-edetato 65 mg, manganeso-edetato 162.5 mg, selenito de sodio 50 mg, sulfato de magnesio anhidro 1 250 mg, yoduro de potasio 250 mg, zinc-edetato 187.5 mg, inulina 500 mg, probióticos* 0.1 billón UFC, excipientes c.s.p 100 g.

(*) mezcla de probióticos: *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus*, *Enterococcus faecium*, *Aspergillus oryzae*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Bacillus coagulans*.

Indicaciones

Suplemento nutricional para optimizar todas las funciones orgánicas, el crecimiento del animal, la producción y la salud en general. Especialmente recomendado como coadyuvante en todas las enfermedades infecciosas, intoxicaciones, convalecencias, cambios bruscos de temperatura, pre y pos vacunaciones, deshidratación, transporte, como factor anti-estrés y reconstituyente frente a cualquier situación patógena. Utilizar luego de procesos entéricos tanto infecciosos como no infecciosos.

Dosis

Agua: En general 500 - 750 g/1 000 L agua (0.5 - 0.75 g/L de agua).

Alimento: En general 200 - 250 g/tonelada de alimento (0.20 - 0.25 g/kg de alimento).

Presentación

15 g, 100 g, 1 kg, 10 kg y 20 kg.



Vequinax WS

*Suplemento nutracéutico con acción
inmunoestimulante*



Polvo
Soluble



Línea
Inmunidad



Composición

Cada 100 g contiene: Extracto de *Echinacea purpurea* (eq. a ácido chicórico 0.4 g) 25 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Indicaciones

Estimula el sistema de defensa inmunológico en todas las especies y está indicado como tratamiento complementario en caso de infecciones de cualquier índole, fiebre, retrasos de crecimiento y otras afecciones. Su acción inmuno-estimulante se da mejorando la inmunidad celular y humoral, estimulando la secreción de interferón y mejorando de la capacidad de las células blancas. Como resultado de su aplicación, se obtiene un mayor título de anticuerpos, lográndose mejoras en la inmunidad pos vacunal. Adicionalmente, inhibe la replicación viral y puede prevenir el brote de enfermedades. Ayuda en la prevención de brotes de peste porcina, gripe porcina, PRRS (Síndrome reproductivo y respiratorio porcino), y PCV (circovirus porcino). Como una ayuda en la prevención y tratamiento de enfermedades virales aviares como IBD, Newcastle, influenza, etc.

Dosis

Aves y porcinos en general: 50 - 100 g/200 L de agua ó 50 - 100 g/100 kg de alimento.

Aves: Terapia adyuvante de enfermedades virales: 100 g en 150 L de agua o 100 kg de alimento total por 5 – 7 días; pollos broiler/patos/pavos: 100 g en 200 L de agua después de la vacunación o usar entre el día 1 – 3 de edad y luego, cada 10 días por 3 días. Ponedoras: usar 3 días cada mes o después de la vacunación, 100 g en 200 L de agua.

Porcinos: Lechones: mezclar 100 g con 100 kg del alimento, usarlo por dos semanas; marranas: 100 g en 150 kg de alimento o 300 L de agua, usar 7 días antes de la monta, 7 días después del parto, 7 días después del destete por 3 – 5 días; cerdos entre la semana 13 y 17 de edad: 100 g en 150 kg de alimento o 300 L de agua, por 3 - 5 días.

Presentación

100 g, 1 kg y 20 kg.

Premezclas

Hepaviar® Px

Microquel® Broiler 8 in 1 Px

Microquel® Layer 6 in 1 Px

Microquel® Pig Starter 8 in 1 Px

Microquel® Pig Grow 8 in 1 Px

Microquel® Sow 8 in 1 Px

Microquel® Cu Px

Microquel® Fe Px

Microquel® Mn Px

Microquel® Zn Px

ProBioenzyme® Px



Hepaviar® Px

Asociación balanceada hepatoprotectora - Lipotrópica – desintoxicante



Composición

Cada 100 g contiene: Silimarina 15 g, extracto seco de alcachofa 15 g, DL-metionina 5g, L-lisina 2 g, inulina 2 g, sulfato de magnesio heptahidrato 2 g, betaina 1 g, excipientes c.s.p. 100 g.

Descripción

Hepaviar® Px es una asociación balanceada de ingredientes fácilmente asimilables, para corregir deficiencias de nutrientes esenciales relacionadas con alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos. Actúa como un complejo lipotrópico, protector hepático, desintoxicante y estimula el correcto movimiento y utilización de las grasas, así como un correcto metabolismo energético del animal.

Indicaciones

Cuando se requiera un efecto protector y regenerador del hepatocito, efecto colagogo, colerético, lipotrópico y desintoxicante: dietas con elevado contenido energético, intoxicaciones, tratamiento o prevención de síndrome de hígado graso (lipidosis hepática), tratamiento de micotoxicosis, preparación de aves para muda forzada, mejorador del apetito y conversión alimenticia. Hepatitis agudas y crónicas. Síndrome cólico. Estados infecciosos. En todos los casos en que se administren medicamentos que comprometan el parénquima hepático y por ende su función (antibióticos, antiparasitarios, anestésicos, tranquilizantes, etc.). Disfunciones gastrointestinales, entre otros.

Dosis

En fases estratégicas o durante todo el periodo de crianza: 200-350 g/TM de alimento (2g - 3.5g/10 kg alimento).

Presentación

15 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 10 kg y 20 kg.



Microquel® Broiler 8 in 1 Px

*Microelementos orgánicos quelatados y
protegidos con metionina para pollos de engorde*



Premezcla

Composición

Cada 100 g contiene: Hierro (hierro-AHM*) 3 000 mg, zinc (zinc-AHM*) 4 000 mg, cobre (cobre-AHM*) 1 000 mg, manganeso (manganeso-AHM*) 4 000 mg, yodo 50 mg, cobalto (cobalto-AHM*) 20 mg, selenio (selenio-AHM*) 30 mg; cromo (cromo-AHM*) 20 mg, metionina (AHM*) 32 000 mg; excipientes c.s.p. 100 g, (*)Análogo de Hidroxi-Metionina.

Descripción

Microquel® Broiler 8 in 1 Px es una fórmula balanceada que combina 8 microelementos esenciales asociados a metionina bajo la forma AHM*, enlace que les otorga un rendimiento superior al darles la propiedad de ser orgánicos y mantenerse intactos hasta el intestino delgado donde va a aumentar la biodisponibilidad y serán absorbidos fácilmente hacia el torrente sanguíneo y finalmente transportados hacia los tejidos y órganos para su utilización. La quelación orgánica con AHM* protege a los minerales de reacciones no deseadas en el intestino; la liberación y absorción pasiva a través del lumen intestinal son excepcionalmente mejoradas con respecto a minerales inorgánicos.

Indicaciones

Cubre las necesidades de microminerales por deficiencias en la dieta de los pollos de engorde, optimizando su potencial genético para un óptimo crecimiento y desarrollo.

Dosis

De 1 a 1.6 kg/TM de alimento o de acuerdo a la indicación del médico veterinario/nutricionista.

Presentación

100 g, 1 kg y 20 kg.



Microquel® Layer 6 in 1 Px

Microelementos orgánicos quelatados y protegidos con metionina para gallinas de postura



Premezcla



Línea
Producción



Composición

Cada 100 g contiene: Zinc (zinc-AHM*) 5 000 mg, cobre (cobre-AHM*) 1 000 mg, manganeso (manganeso-AHM*) 4 000 mg, yodo 50 mg, selenio (selenio-AHM*) 30 mg; cromo (cromo-AHM*) 20 mg, metionina (AHM*) 26 000 mg; excipientes c.s.p. 100 g, (*)Análogo de Hidroxi-Metionina.

Descripción

Microquel® Layer 6 in 1 Px es una fórmula balanceada que combina microelementos esenciales asociados a metionina bajo la forma AHM*, enlace que les otorga un rendimiento superior al darles la propiedad de ser orgánicos y mantenerse intactos hasta el intestino delgado donde va a aumentar la biodisponibilidad y serán absorbidos fácilmente hacia el torrente sanguíneo y finalmente transportados hacia los tejidos y órganos para su utilización. La quelación orgánica con AHM* protege a los minerales de reacciones no deseadas en el intestino; la liberación y absorción pasiva a través del lumen intestinal son excepcionalmente mejoradas con respecto a minerales inorgánicos.

Indicaciones

Cubre las necesidades de microminerales por deficiencias en la dieta de gallinas ponedoras, optimizando su potencial genético para un óptimo crecimiento y desarrollo.

Dosis

De 0.6 a 1 kg/TM de alimento o de acuerdo a la indicación del médico veterinario/nutricionista.

Presentación

100 g, 1 kg y 20 kg.



Microquel® Pig Starter 8 in 1 Px

Microelementos orgánicos quelatados y protegidos con metionina para lechones en etapa de inicio



Premezcla



Línea Producción



Premezcla

Composición

Cada 100 g contiene: Hierro (hierro-AHM*) 6 000 mg, zinc (zinc-AHM*) 4 000 mg, cobre (cobre-AHM*) 1 000 mg, manganeso (manganeso-AHM*) 2 000 mg, yodo 20 mg, cobalto (cobalto-AHM*) 25 mg, selenio (selenio-AHM*) 15 mg; cromo (cromo-AHM*) 10 mg, metionina (AHM*) 35 000 mg; excipientes c.s.p. 100 g, (*)Análogo de Hidroxi-Metionina.

Descripción

Microquel® Pig Starter 8 in 1 Px es una fórmula balanceada que combina 8 microelementos esenciales asociados a metionina bajo la forma AHM*, enlace que les otorga un rendimiento superior al darles la propiedad de ser orgánicos y mantenerse intactos hasta el intestino delgado donde va a aumentar la biodisponibilidad y serán absorbidos fácilmente hacia el torrente sanguíneo y finalmente transportados hacia los tejidos y órganos para su utilización. La quelación orgánica con AHM* protege a los minerales de reacciones no deseadas en el intestino; la liberación y absorción pasiva a través del lumen intestinal son excepcionalmente mejoradas con respecto a minerales inorgánicos. Su inclusión en la fórmula alimenticia del lechón permite mejorar la palatabilidad.

Indicaciones

Cubre las necesidades de microminerales por deficiencias en la dieta de los lechones en etapa de inicio, optimizando su potencial genético para un óptimo crecimiento y desarrollo desde el destete hasta que los animales tengan un peso de 25 - 30 kg.

Dosis

En general, de 1 a 2 kg/TM de alimento (1 a 2 g/kg) o de acuerdo a la indicación del médico veterinario/nutricionista.

Presentación

100 g, 1 kg y 20 kg.



Microquel® Pig Grow 8 in 1 Px

Microelementos orgánicos quelatados y protegidos con metionina para cerdos en crecimiento



Composición

Cada 100 g contiene: Hierro (hierro-AHM*) 3 000 mg, zinc (zinc-AHM*) 3 000 mg, cobre (cobre-AHM*) 1 000 mg, manganeso (manganeso-AHM*) 1 500 mg, yodo 10 mg; cobalto (cobalto-AHM*) 15 mg, selenio (selenio-AHM*) 15 mg, cromo (cromo-AHM*) 10 mg, * metionina (AHM) 25 000 mg, excipientes c.s.p. 100 g, (*)Análogo de Hidroxi-Metionina.

Descripción

Microquel® Pig Grow 8 in 1 Px es una fórmula balanceada que combina 8 microelementos esenciales asociados a metionina bajo la forma AHM*, enlace que les otorga un rendimiento superior al darles la propiedad de ser orgánicos y mantenerse intactos hasta el intestino delgado donde va a aumentar la biodisponibilidad y serán absorbidos fácilmente hacia el torrente sanguíneo y finalmente transportados hacia los tejidos y órganos para su utilización. La quelación orgánica con AHM* protege a los minerales de reacciones no deseadas en el intestino; la liberación y absorción pasiva a través del lumen intestinal son excepcionalmente mejoradas con respecto a minerales inorgánicos.

Indicaciones

Cubre las necesidades de microminerales por deficiencias en la dieta de los cerdos en etapa de crecimiento, optimizando su potencial genético para un óptimo crecimiento y desarrollo desde los 25-30 kg hasta que los animales tengan un peso de 50 - 60 kg.

Dosis

En general, de 1 a 2 kg/ TM de alimento (1 a 2 g/kg) o de acuerdo a la indicación del médico veterinario/nutricionista.

Presentación

100 g, 1 kg y 20 kg.



Microquel® Sow 8 in 1 Px

*Microelementos orgánicos quelatados
y protegidos con metionina para marranas*



Premezcla

Composición

Cada 100 g contiene: Hierro (Hierro-AHM*) 3 500 mg, zinc (zinc-AHM*) 4 000 mg, cobre (cobre-AHM*) 1 000 mg, manganeso (manganeso-AHM*) 1 500 mg, yodo 15 mg, cobalto (cobalto-AHM*) 10 mg, selenio (selenio-AHM*) 20 mg, cromo (cromo-AHM*) 13 mg, *metionina (AHM) 28 000 mg, excipientes c.s.p. 100 g, (*)Análogo de Hidroxi-Metionina.

Descripción

Microquel® Sow 8 in 1 Px es una fórmula balanceada que combina 8 microelementos esenciales asociados a metionina bajo la forma AHM*, enlace que les otorga un rendimiento superior al darles la propiedad de ser orgánicos y mantenerse intactos hasta el intestino delgado donde va a aumentar la biodisponibilidad y serán absorbidos fácilmente hacia el torrente sanguíneo y finalmente transportados hacia los tejidos y órganos para su utilización. La quelatación orgánica con AHM* protege a los minerales de reacciones no deseadas en el intestino; la liberación y absorción pasiva a través del lumen intestinal son excepcionalmente mejoradas con respecto a minerales inorgánicos.

Indicaciones

Cubre las necesidades de microminerales de las marranas, optimizando su potencial genético para un óptimo crecimiento, desarrollo y rendimiento reproductivo. Prevención y tratamiento de deficiencias asociadas a los minerales de la fórmula.

Dosis

En general, de 1 - 2 kg/ TM de alimento (1 - 2 g/kg) o de acuerdo a la indicación del médico veterinario/nutricionista.

Presentación

100 g, 1 kg y 20 kg.



Microquel® Cu Px

*Microelemento orgánico quelado
como complejo cobre-aminoácido
y protegido con glicina para animales
de producción*



Composición

Cobre (como glicina quelato de cobre): no menos de 21% en peso.

Microquel® Cu contiene además 24% del aminoácido glicina de alto valor nutricional.

Descripción

Microquel® Cu es un ingrediente nutricional para el alimento de los animales de producción, que contiene cobre orgánico bajo la forma de un quelato de glicina altamente biodisponible. La glicina es un aminoácido y es el más simple encontrado en las proteínas y posee solo dos átomos de hidrógeno como cadena lateral. Debido a esto, la quelación es óptima y puede adecuarse tanto a un entorno hidrofílico como hidrofóbico. Este proceso de quelación, otorga una biodisponibilidad al cobre cercana al 100% para el animal.

Indicaciones

Prevención y tratamiento de deficiencias de cobre en los animales de producción. Indicaciones específicas incluyen: muerte embrionaria incrementada, índices de fertilidad reducidos; anemias, retraso de crecimiento, mayor incidencia de neumonías y diarreas. Pesos al destete disminuidos, susceptibilidad a enfermedades e incremento de estrés. Además genera cambios de color y mejora de la integridad de la piel, pelaje y pezuñas, así como la calidad de la carne y huevos.

Dosis

Aves: 38 – 48 g/TM de alimento (8 – 10 ppm Cu).

Porcinos: Lechones hasta 12 semanas 715 g/TM de alimento (150 ppm Cu); cerdos mayores a 12 semanas 38 g/TM de alimento (8 ppm Cu); Marranas 48 g/TM de alimento (10 ppm Cu); Marranas en lactación 95 g/TM (20 ppm Cu).

Presentación

1 kg y 20 kg.



Microquel® Fe Px

Microelemento orgánico quelado como complejo hierro-aminoácido y protegido con glicina para animales de producción



Premezcla



Línea Producción



Premezcla

Composición

Hierro (como glicina quelato de hierro): no menos de 17% en peso.

Microquel® Fe contiene además 22% del aminoácido glicina de alto valor nutricional.

Descripción

Microquel® Fe es un ingrediente nutricional para el alimento de los animales de producción, que contiene hierro orgánico bajo la forma de un quelato de glicina altamente biodisponible. La glicina es un aminoácido y es el más simple encontrado en las proteínas y posee solo dos átomos de hidrógeno como cadena lateral. Debido a esto, la quelación es óptima y puede adecuarse tanto a un entorno hidrofílico como hidrofóbico. Este proceso de quelación, otorga una biodisponibilidad al cobre cercana al 100% para el animal.

Indicaciones

Prevención y tratamiento de deficiencias de hierro en los animales de producción. Indicaciones específicas incluyen: anemias ferropénicas, disminución de peso al destete, aumento de la susceptibilidad a enfermedades, etapas de mayor estrés, retraso de crecimiento, problemas de infertilidad y muerte embrionaria aumentada. Además mejora el color e integridad de la piel, pelaje, pezuñas; la calidad de huevos y plumas. Mejora la calidad de la carne y rendimiento productivo.

Dosis

Aves: 300 – 500 g/TM de alimento (50 – 80 ppm Fe).

Porcinos: Lechones hasta 25 kg de P.v. 300 – 600 g/TM de alimento (50 – 120 ppm Fe); cerdos en crecimiento y engorde 300 – 350 g/TM de alimento (50 – 60 ppm Fe); Marranas 250 – 475 g/TM de alimento (45 – 80 ppm Fe).

Presentación

1 kg y 20 kg.



Microquel® Mn Px

*Microelemento orgánico quelado
como complejo manganeso-aminoácido
y protegido con glicina para animales
de producción*



Premezcla



Línea
Producción



Composición

Manganeso (como glicina quelato de manganeso): no menos de 22% en peso.

Microquel® Mn contiene además 29% del aminoácido glicina de alto valor nutricional.

Descripción

Microquel® Mn es un ingrediente nutricional para el alimento de los animales de producción, que contiene manganeso orgánico bajo la forma de un quelato de glicina altamente biodisponible. La glicina es un aminoácido y es el más simple encontrado en las proteínas y posee solo dos átomos de hidrógeno como cadena lateral. Debido a esto, la quelación es óptima y puede adecuarse tanto a un entorno hidrofílico como hidrofóbico. Este proceso de quelación, otorga una biodisponibilidad al manganeso cercana al 100% para el animal.

Indicaciones

Prevención y tratamiento de deficiencias de manganeso en los animales de producción. Indicaciones específicas incluyen: retraso en la madurez sexual, muerte (y/o malformación) embrionaria incrementada, fertilidad reducida en machos y hembras. Anomalías de la piel, pelo y pezuñas. Desarrollo anómalo de huesos y articulaciones, debilidad ósea, perosis y condrodistrofia, deterioro en la capacidad de regenerar cartílago articular, cojeras. Deficiencia en la calidad de la cáscara de huevo; pesos disminuidos al destete. Aumento en la susceptibilidad a enfermedades, en épocas de mayor incidencia de neumonías y diarreas y en etapas de mayor estrés. Además, mejora la respuesta inmune, la calidad y la producción de carne y huevos.

Dosis

Aves: 100 – 280 g/TM de alimento (20 – 60 ppm Mn).

Porcinos: Lechones y cerdos de engorde 50 – 100 g/TM de alimento (10 – 20 ppm Mn); Marranas 100 – 120 g/TM de alimento (20 – 25 ppm Mn).

Presentación

1 kg y 20 kg.



Microquel® Zn Px

Microelemento orgánico quelado como complejo zinc-aminoácido y protegido con glicina para animales de producción



Premezcla

Composición

Zinc (como glicina quelato de zinc): no menos de 21% en peso.

Microquel® Zn contiene además 23% del aminoácido glicina de alto valor nutricional.

Descripción

Microquel® Zn es un ingrediente nutricional para el alimento de los animales de producción, que contiene zinc orgánico bajo la forma de un quelato de glicina altamente biodisponible. La glicina es un aminoácido y es el más simple encontrado en las proteínas y posee solo dos átomos de hidrógeno como cadena lateral. Debido a esto, la quelación es óptima y puede adecuarse tanto a un entorno hidrofílico como hidrofóbico. Este proceso de quelación, otorga una biodisponibilidad al zinc cercana al 100% para el animal.

Indicaciones

Prevención y tratamiento de deficiencias de zinc en los animales de producción. Indicaciones específicas incluyen: Prevención y tratamiento de problemas podales y de la salud del casco, calidad de la cáscara de huevo, índices de fertilidad reducidos, mayor incidencia de neumonías y diarreas, pesos disminuidos al destete. En casos de debilidad ósea, enanismo, crecimiento retrasado e índice de conversión elevado. Mejora de la cicatrización de heridas, la integridad y queratinización de la piel (previene la paraqueratosis en cerdos), mejora el brillo, calidad y coloración del pelaje (plumas en el caso de aves). Mejora la respuesta inmune, mejora la calidad y la producción de carne y huevos.

Dosis

Aves: 100 - 240 g/TM (20 - 50 ppm Zn).

Porcinos: Lechones hasta 25 kg de P.v. 380 – 480 g/TM de alimento (80 – 100 ppm Zn); cerdos en crecimiento y engorde 240 – 300 g/TM de alimento (50 – 60 ppm Zn); Marranas 500 g/TM de alimento (100 ppm Zn).

Presentación

1 kg y 20 kg.



ProBioenzyme® Px

Premezcla enzimática, probiótica y prebiótica



Composición

Cada 1g contiene: Proteasa ácida (*) 2 800 U, α -amilasa (*) 45 000 U, β -mananasa (*) 23 000 U, xilanasa (*) 192 000 U, β -glucanasa (*) 46 000 U, celulasa (*) 6 500 U, pectinasa (*) 4 800 U, fitasa (*) 1 500 U, inulina 5.50 mg, fructooligosacáridos (FOS) 10 mg, probióticos (**) 1.05 billones UFC, excipientes c.s.p 1g. (*) como complejo enzimático. (**) mezcla de probióticos: *Lactobacillus plantarum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus licheniformis*, *Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium bifidum*, *Streptococcus thermophilus*, *Enterococcus faecium*, *Aspergillus oryzae*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Bacillus coagulans*.

Descripción

ProBioenzyme® posee un complejo enzimático de origen bacteriano que participa dentro de las reacciones químicas que sufren los alimentos a nivel intestinal, ayuda a descomponer los ingredientes de la ración en los nutrientes que el organismo necesita, ahorrando energía y aumentando la biodisponibilidad de proteínas, aminoácidos y carbohidratos. Además, provee probióticos que colonizan el tracto digestivo, que mediante exclusión competitiva con los organismos patógenos y otros mecanismos, les genera un medio ambiente no favorable para su establecimiento. Los prebióticos (inulina) brindan soporte nutricional para el beneficio de la microflora en el tracto gastrointestinal (TGI).

Indicaciones

Para mejorar la digestión de múltiples nutrientes presentes en los diferentes ingredientes alimenticios, y con ello favorecer su asimilación y así disminuir el índice de conversión alimenticia. Para mejorar la productividad mediante la mejora de la salud del TGI.

Dosis

Aves: 0.25 a 0.50 kg/TM de alimento. Gallinas: 0.25 kg/TM de alimento.

Porcinos: 0.50 kg/TM de alimento.

Presentación

100 g, 1 kg y 20 kg.

Para más información sobre nuestros productos y su red de distribución, ingresa a **www.avivet.net** y a **www.nutrovet.com**
Avivet® y **Nutrovet®** son marcas registradas por **AGROVET MARKET**
Animal Health, PRODUCTOS VETERINARIOS DE CLASE ÚNICA
www.agrovetmarket.com

 /avivetAM y  /nutrovetAM

Av. Canadá 3792-3798 / San Luis 15021 Lima – Perú