

Gallonil® Spray

Solución externa

Antiparasitario de amplio espectro y efecto residual

agrovetmarket s.a.

FORMULACIÓN

Cada mL contiene:
Fipronil 1.25 mg
Excipientes c.s.p. 1mL

INDICACIONES

Gallonil® Spray proporciona un control efectivo sobre pulgas, piojos, ácaros y garrapatas en gallos de pelea desde la primera semana de edad.

CARACTERÍSTICAS

Gallonil® Spray es un insecticida de acción rápida y prolongada. Controla rápidamente la infestación de ectoparásitos. Previene la reinfección y elimina rápidamente el stress en los gallos, resultante de las molestias causadas por las pulgas, piojos, ácaros y garrapatas, por la pérdida de sangre, picazón y por reacciones alérgicas a las picaduras. El efecto residual de Gallonil® Spray previene la reinfección por un período de por lo menos 45 días. Los estudios han mostrado que Gallonil® Spray puede proteger gallos contra ectoparásitos por más de 45 días.

MECANISMO DE ACCIÓN

El fipronil, principio activo de Gallonil® Spray, actúa desestabilizando las funciones nerviosas normales de los ectoparásitos. Bloquea los canales clorídricos de la barrera GABA (ácido gamma aminobutyrico) de las neuronas en el Sistema Nervioso Central. El sistema receptor GABA es el responsable de inhibir la actividad neuronal normal (por ejemplo: previene la estimulación excesiva de los nervios). Cuando las funciones regulares del sistema son bloqueadas por el fipronil, causa excitación neural y la muerte del insecto. El fipronil mata al insecto por contacto o ingestión. El curso principal de actividad depende del insecto objetivo.

INDICACIONES, DOSIS Y DIRECCIONES PARA SU USO

Gallonil® Spray está indicado sólo en gallos de pelea para la prevención y tratamiento de:

- Piojos: *Menopon spp., Menacanthus spp., Goniodes spp., Lipeurus spp., Columbicola spp.*
- Pulgas: *Echidnophaga gallinacea.*
- Acaros: *Dermanyssus gallinaceus, Megninia cubitalis, Ornithonyssus sylviarum.*
- Garrapatas: *Argas persicus.*

La dosis a utilizar es de 1 mg/kg de peso vivo, lo que en la práctica equivale a 0.8 mL/kg de peso vivo.

Para prevenir cualquier daño a usted y/o a sus gallos, se recomienda leer la etiqueta, caja y/o las indicaciones adjuntas previamente a cada uso. Siga detenidamente todas las indicaciones y direcciones. Utilícelo sólo en gallos de pelea. No utilice en otros animales.

Para matar piojos, pulgas, ácaros y garrapatas, aplicar a los gallos (de cualquier edad) como se indica:

- Emplee guantes de látex de uso doméstico y de ser posible anteojos protectores.
- Sostenga la botella en posición vertical. Levante las plumas del animal con una mano mientras aplica el spray en la parte posterior, a los lados, vientre, piernas, alas, y cuello del animal. Para el área de la cabeza y de los ojos, aplique Gallonil® Spray en la mano con guantes y frote suavemente las plumas del animal. Mantenga alejado de los ojos y pico del ave.
- Aplique el spray hasta que las plumas del animal estén húmedas o completamente mojadas. Se requiere aproximadamente 8 mL por cada kg de peso vivo. El frasco de 550 mL deberá ser usado como refil (recarga) para cualquiera de los frascos mencionados (no viene acompañado de spray dosificador).

Para prevenir el aumento o la reinfección por ectoparásitos, emplear Gallonil® Spray antes del inicio de temporadas calurosas y después mensualmente o de acuerdo a criterio del responsable. No se recomienda aplicaciones con menos de 30 días de intervalo.

Para el control de garrapatas se debe humedecer al animal por completo, sobre todo en la cabeza y cuello. Se puede dirigir el spray directamente a la

garrapata aunque no es estrictamente necesario.

No se recomienda bañar ni mojar al ave 4 días antes ni 4 días después del tratamiento pues el tiempo de acción de Gallonil® Spray se ve afectado con la exposición al agua.

PREVENCIÓN

Humanos: Gallonil® Spray es muy seguro cuando se usa de acuerdo a las instrucciones. Sin embargo, es dañino si se ingiere o se absorbe por la piel. Puede causar irritación severa en los ojos. Evite respirar el spray. Evite el contacto con piel, cara, ojos o ropa. Como con cualquier producto insecticida, debe lavarse a fondo tanto las manos como la piel expuesta al producto con abundante agua y jabón, después de su uso.

Animales: Sólo para uso externo. Estudios realizados con Gallonil® Spray demostraron que es muy seguro cuando se usa de acuerdo a las instrucciones. Sin embargo, puede causar irritación severa en los ojos. Tenga cuidado de no rociar sobre los ojos ni cara del ave. Si se usa en pollitos, hacerlo con extremo cuidado, vigilándolos hasta que estén completamente secos. Puede ocurrir sensibilidad individual después de emplear cualquier pesticida, aunque es raro. Si los signos persisten, o llegan a ser más severos, consultar a un Médico Veterinario inmediatamente. Ciertas medicinas pueden interactuar con pesticidas. Consulte al Médico Veterinario antes de utilizar este producto en animales medicados y/o junto con otros pesticidas. Este producto puede ser perjudicial para animales débiles, viejos o bajo cuidado. *No utilizar en otras especies ni consumir la carne de los gallos hasta transcurridos 60 días del último tratamiento.*

Propiedades físico-químicas: Inflamable. Alejelo del calor y llamas.

Primeros auxilios (humanos):

- Por ingestión: llamar a un médico de inmediato. Beba 1 ó 2 vasos de agua e induzca el vómito tocando la parte posterior de la garganta con el dedo. Si la persona está inconsciente, no dar nada vía oral ni inducir al vómito.
- Por inhalación: lleve la víctima al aire libre. Si no respira, dar respiración artificial, preferiblemente boca a boca, llamar a un médico de inmediato.
- Por contacto en los ojos: Lavar los ojos con abundante agua. Consulte a un médico si la irritación persiste.
- Por contacto en la piel: Lávese inmediatamente con abundante agua y jabón. Consulte a un médico si la irritación persiste.

PERIODO DE RETIRO

No utilizar en otras especies ni consumir la carne de los gallos hasta transcurrir 60 días del último tratamiento.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DEL ENVASE

Almacenar el producto nuevo en su frasco original únicamente. No reutilizar el envase ni incinerarlo. Envolver el frasco vacío en varias capas de papel y desechar en la basura.

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Almacenar entre 15° y 30° C. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

PRESENTACION COMERCIAL

Caja Individual conteniendo frascos PET por 55 mL, 110 mL y 275 mL acompañados de bomba dosificadora.

Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado en este inserto

Reg. SENASA Perú: F.07.08.N.0302; Bolivia: SENASAG Reg. PUV- F N° 007121/16; Costa Rica: Reg. MAG PE10-43-04-4082; Reg. El Salvador: VE2014064925; Reg. Guatemala: PE634-43-02-5230; Reg. Honduras: IP-529; Reg. Panamá: RF-3318-15; Reg. Rep. Dominicana: 5637; Reg. Venezuela: MAT-SASA-P.I. 11.300

Gallonil® es una marca registrada de:



agrovetmarket
animalhealth

Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 30 - Perú

Tel: (511) 2 300 300

Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

Fabricado por Laboratorios Labodec S.A.C.

Calle Los Talladores 373- Urb. El Artesano- Ate. Lima-Perú.

402070861519

V3/06/17

Gallonil® Spray

External solution

Wide spectrum and residual effect antiparasitic

agrovetmarket s.a.

FORMULATION

Each mL contains:

Fipronil 1.25 mg
Excipients..... q.s.ad. 1mL

INDICATIONS

Gallonil® Spray provides an effective control of fleas, lice, mites and ticks in fighting cocks from the first week of age.

CHARACTERISTICS

Gallonil® Spray is an insecticide of fast and prolonged action. It controls the ectoparasites infestation quickly. It prevents the reinfestation and eliminates stress in cocks resulting from the annoyance caused by the fleas, lice, mites and ticks, the loss of blood, the itch and the allergic reactions to the bites. The residual effect of **Gallonil® Spray** prevents the reinfestation by a period of at least 45 days. The studies have shown that **Gallonil® Spray** can protect cocks against ectoparasites for more than 45 days.

ACTION MECHANISM

Fipronil, active ingredient of **Gallonil® Spray**, acts destabilizing the normal nervous functions of the ectoparasites. It blocks the hydrochloride channels of GABA barrier (gamma amino butyric acid) of the neurons in the central nervous system. The receptive GABA system is responsible for the inhibition of the normal neuronal activity (e.g. it prevents the excessive stimulation of the nerves). When the regular functions of the system are blocked by fipronil, it causes neural excitation and the insect's death. Fipronil kills the insect by contact or ingestion. The main activity course depends on the objective insect.

INDICATIONS, DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE

Gallonil® Spray is indicated only on fighting cocks for the prevention and treatment of:

- Lice: *Menopon* spp., *Menacanthus* spp., *Goniodes* spp., *Lipeurus* spp., *Columbicola* spp.
- Fleas: *Echidnophaga gallinacea*.
- Mites: *Dermanyssus gallinae*, *Megninia cubitalis*, *Ornithonyssus sylviarum*.
- Ticks: *Argas persicus*.

The dose to use is 1 mg/kg of body weight, which is equivalent to 8 mL/kg of body weight.

To prevent any damage to you and/or your cocks, it is recommended to read the label, box and/or insert before its use. Follow completely the indications and directions. Use only in fighting cocks. Do not use in other animals.

To kill fleas, lice, mites and ticks, apply to cocks (of any age) as indicated.

- Use latex domestic gloves and eye protection when is possible.
- Hold the bottle in vertical position. Lift the animal's feather with one hand while applying the spray in the back of the animal, the sides, belly, legs, wings and neck. For the head and eyes area, apply **Gallonil® Spray** in your hand with gloves on and rub gently in the animal's feather. Keep it away from cock's eyes and peak.
- Apply the spray until the feather is damp or completely wet. Approximately 3 - 6 mL per kg of body weight are required. The 550 mL bottle must be used as a refill (recharge) for any of the other presentations (it does not come with a nozzle).

In order to prevent the increase or the re infestation of ectoparasites, use **Gallonil® Spray** before the beginning of warm seasons and later monthly or according veterinary advice. Applications with less than 30 days of interval is not recommended.

For tick control the animal must be dampen completely, mainly in the head and neck. Spray can be orientated directly to the tick although it is not strictly necessary.

It is recommended not to bathe neither to wet the cock 4 days before nor 4 days after the treatment because the time of action of **Gallonil® Spray** is affected by the exposure to water.

PRECAUTIONS

Humans: **Gallonil® Spray** is very safe when used according to the instructions. Nevertheless, it is harmful if swallowed or absorbed by the skin. It can cause severe eye irritation. Avoid breathing the spray. Avoid the skin, face, eyes or clothes contact. After its application, wash hands and skin exposed with plenty of water and soap.

Animals: Only for external use. Studies made with **Gallonil® Spray** demonstrated that it is very safe when it is used according to the instructions. Nevertheless, it can cause severe irritation in the eyes. Be careful not to sprinkle on the cock's eyes or face. If used in chickens, do it with extreme care, watching them until they are completely dry. Individual sensitivities can happen after using any pesticide, although they are rare. If signs persist, or get to be more severe, consult a veterinary doctor immediately. Certain medicines can interact with pesticides. Consult a veterinary doctor before using this product on medicated animals and before using this product with other pesticides. This product can be detrimental for weak or old animals.

Physical-chemical properties: Inflammable. Keep away of heat and flame.

First aid: (humans)

- By ingestion: call immediately a doctor. Drink 1 or 2 glasses of water and induce vomit by touching the rear part of the throat with the finger. If the person is unconscious, do not give anything by the mouth nor induce vomit.
- By inhalation: take the victim outdoors. If it does not breath, give artificial respiration, preferably CPR; call immediately to a doctor.
- By eyes contact: wash the eyes with plenty of water. Consult a doctor if the irritation persists.
- By skin contact: wash immediately with plenty of water and soap. Consult a doctor if the irritation persists.

WITHDRAWAL PERIOD

Not to be used in other species and do not consume the cock's meat until passed 60 days from the last treatment.

STORAGE AND CONTAINER DISPOSAL

Store the new product in its original bottle only. Do not reuse the package nor incinerate. Wrap the empty bottle in several layers of paper and discard.

Keep in a cool and dry place, protected from light. Store among 15°C to 30°C. Keep out of the reach of children.

COMMERCIAL PRESENTATION

Individual box containing PET bottles of 55 mL, 110 mL and 275 mL with spray pump. Bottle of 550 mL (without spray pump).

Agrovet Market is not responsible for the consequences of a different use (of the product) to the one indicated in this leaflet.

Reg. SENASA Perú: F.07.08.N.0302; Reg. Bolivia: 003116/08;
Costa Rica: Reg MAG PE10-43-04-4082 ; Reg. El Salvador: VE2014064925;
Reg. Guatemala: PE634-43-02-5230; Reg. Honduras: IP-529;
Reg. Panamá: RF-3318-05; Reg. Dominican Republic: 5637;
Reg. Venezuela: MAT-SASA-M.I. 11.300

Gallonil® is a registered trademark of



animal health

Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 30 - Perú
Tel.: (511) 2 300 300
Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com