

#### *Infected Paranal Gland or Cystic Areas:*

Drain the gland or cyst, clean and fill with **Vetamycon 6X** using the cannula if necessary.

Frequency of administration, and duration of treatment: It will depend on the severity of the injury and the criteria of the Veterinarian. In case of moderate conditions, the application of **Vetamycon 6X** can vary from once to twice daily; in severe conditions it can be applied 2 - 4 times daily. According to the etiology and the response of the disease course, it can vary between 2 to 6 weeks.

#### **Side Effects**

No adverse reactions of any kind have been found in the topical application of the components of **Vetamycon 6X**, however, it should be administered with caution to animals that have demonstrated some type of hypersensitivity to any of the components. Such reactions are very rare; however, if present, discontinue treatment and consult with your veterinarian.

#### **Precautions**

- Do not apply if there is evidence or suspicion of rupture of the tympanic membrane.
- Not recommended in the treatment of abscesses or deep infections, nor for the treatment of severe burns.
- It is important to determine the sensitivity of microorganisms before using this product. The use of antibiotics and antifungals can favor the growth of microorganisms not sensitive to the components.
- Discontinue use if adverse reactions are observed.
- Agrovet Market S.A. It is not responsible for the consequences derived from the use of the product other than the one indicated.

#### **Storage**

Store in a cool dry place, protected from light between 15°C and 30°C. Keep out of reach of children and pets.

#### **Commercial Presentation**

Tube x 15, 30, 80 and 100 g. with plastic applicator.

Reg. SENASA Peru: F.F9.39.I.0005



**agrovetmarket**  
animal health

Av. Canada 3792-3798, San Luis, Lima 15021 - Peru  
Tel.: (511) 2 300 300  
Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com  
Manufactured in India by KPLTD for and under license of  
Agrovet Market S.A.



Petmedica® is a division of Agrovet Market Animal Health

V1.0521

## **Vetamycon 6X**

### **Crema Ótica – Dérmbica**

Asociación Polivalente Antibiótica, Antiinflamatoria, Antimicótica, Anestésica, Antialérgica y Antipruriginosa.

**agrovetmarket s.a.**

#### **Composición**

Cada 30 g contiene:  
Gentamicina (sulfato)..... 90 mg  
Clotrimazol..... 300 mg  
Beclometasona Dipropionato..... 7.5 mg  
Lidocaina..... 600 mg  
Excipientes c.s.p..... 30 g

#### **Propiedades**

**Vetamycon 6X** es un producto de uso dermatológico de acción tópica hexavalente (6X): antibiótica, antiinflamatoria, antimicótica, anestésica, antialérgica y antipruriginosa. Se recomienda para el tratamiento de heridas e infecciones bacterianas (Gram+ y Gram-) y fúngicas de la piel y oídos de los animales domésticos. Sus principios activos se absorben con facilidad y actúan rápidamente sobre la lesión, favoreciendo una cicatrización estética de las heridas.

La gentamicina cubre un amplio espectro de bacterias Gram + y Gram - comunes en las lesiones de piel, oídos y mucosas. El clotrimazol aporta la acción antifúngica mientras la beclometasona, reduce el proceso inflamatorio y el edema y junto con la lidocaína, controlan el prurito y el dolor, evitando escoriaciones y automutilaciones por lamido o rascado.

#### **Indicaciones**

Tratamiento de heridas, infecciones bacterianas (Gram+ y Gram-) y fúngicas de la piel y oídos -causadas por gérmenes sensibles- en los animales domésticos. Indicada en:

- Afecciones dérmicas de etiología bacteriana (no virales ni tuberculosas).
- Heridas quirúrgicas (promueve su cicatrización estética).
- Dermatitis exudativas, eczematosas, seborreica o de contacto, intertrigo u otras piodermas, Laceraciones, abrasiones o heridas.
- Tratamiento coadyuvante en casos de dermatitis alérgicas por pulgas, dermatosis y alopecia.
- Otitis externa, agudas o crónicas.
- Onicomicosis y afecciones dérmicas de etiología micótica, tiña.
- Infecciones de la glándula paranal en caninos.

#### **Agentes Susceptibles**

**Vetamycon 6X** es activo contra:

- **Bacterias** *Streptococcus*spp, *Staphylococcus* spp, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp, *Aerobacter* spp, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp, *Citrobacter* spp, *Enterobacter* spp, *Providencia* spp, *Salmonella* spp, *Serratia* spp, *Shigella* spp, *Yersinia pestis* entre otros.
- **Hongos**: *Malassezia* spp., *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* y *Candida albicans*.

#### **Especies De Destino**

Caninos y felinos, equinos. Otras especies de animales domésticos.

#### **Vías De Administración y Dosis**


Vía topical sobre la piel, mucosas, heridas o dentro del canal auditivo o glándulas paranales.

#### *Afecciones Dérmicas:*

Limpiar el área afectada, secar. Aplicar una pequeña cantidad de la suspensión y distribuir uniformemente o frotar con cuidado.

#### *Afecciones Óticas:*

Realizar la limpieza del canal auditivo externo, secar. Inspeccione el canal y remueva los cuerpos extraños como grasa, detritus, garrapatas, etc. Adaptar la boca del tubo a la cánula plástica e introducirla en el canal, aplicando directamente. Llenar el canal auditivo hasta completar el área tratada. Proporcionar un ligero masaje en la base de la oreja para favorecer la adherencia y distribución uniforme.



**Glándula Paranal Infectada o Áreas Enquistadas:**  
Drene la glándula o el quiste, límpie y llene con **Vetamycon 6X** usando la cánula de ser necesario.

Frecuencia de administración, y duración del tratamiento: Dependerá de la severidad de la lesión y del criterio del Médico Veterinario. En caso de afecciones moderadas, la aplicación de **Vetamycon 6X** puede variar desde una a dos veces diarias; en condiciones severas puede ser aplicado 2 - 4 veces diarias. De acuerdo a la etiología y a la respuesta del curso de la enfermedad, puede variar entre 2 a 6 semanas.

#### Efectos Secundarios

No se han encontrado reacciones adversas de ningún tipo en la aplicación tópica de los componentes de **Vetamycon 6X**, sin embargo, debe ser administrado con cautela a animales que han demostrado algún tipo de hipersensibilidad a alguno de los componentes. Tales reacciones son muy raras; no obstante, de presentarse, descontinuar el tratamiento y consultar con su veterinario.

#### Precauciones

- No aplicar si existe indicio o sospecha de ruptura de la membrana timpánica.
- No recomendado en el tratamiento de abscesos o infecciones profundas, ni tampoco para el tratamiento de quemaduras graves.
- Es importante determinar la sensibilidad de los microorganismos antes del uso de este producto. El uso de antibióticos y antimicóticos puede favorecer el crecimiento de microorganismos no sensibles a los componentes.
- Suspender su uso si se observan reacciones adversas.
- Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso del producto diferente al indicado.

#### Almacenamiento

Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños y de los animales domésticos.

#### Presentación Comercial

Tubo x 15, 30, 80 y 100 g. con aplicador plástico.

Reg. SENASA Perú: F.F9.39.I.0005



**agrovetmarket**  
animal health

Av. Canadá 3792-3798, San Luis, Lima 15021 - Perú  
Tel.: (511) 2 300 300  
Email: ventas@agrovetmarket.com - Web: www.agrovetmarket.com

Importado y distribuido en Perú por Agrovet Market S.A.  
Ecuador por Grupo Grandes S.A. Calle N74C y Calle E4. Quito.  
Fabricado en India por KPLTD para y bajo licencia de  
Agrovet Market S.A.  
VENTA LIBRE



Petmedica® es una división de Agrovet Market Animal Health

## Vetamycon 6X

### Otic-Dermal Cream

Multipurpose Antibiotic, Anti-inflammatory, Antifungal, Anesthetic, Antiallergic and Antipruritic Association.

**agrovetmarket s.a.**

#### Composition

Each 30 g contain:	
Gentamicin (sulfate) .....	90 mg
Clotrimazole.....	300 mg
Beclomethasone Dipropionate.....	7.5 mg
Lidocaine .....	600 mg
Excipients q.s.ad.....	30 g

#### Properties

**Vetamycon 6X** Is a product of dermatological use of hexavalent topical action (6X): antibiotic, anti-inflammatory, antifungal, anesthetic, antiallergic and antipruritic. It is recommended for the treatment of wounds and bacterial (Gram + and Gram-) and fungal infections of the skin and ears of domestic animals. Its active ingredients are easily absorbed and act quickly on the lesion, favoring an aesthetic wound healing.

Gentamicin covers a broad spectrum of Gram + and Gram bacteria - common in skin, ear and mucous lesions. Clotrimazole provides the antifungal action while beclomethasone, reduces the inflammatory process and edema and together with lidocaine, control pruritus and pain, avoiding scumming and self-mutilation by licking or scratching.

#### Indications

Treatment of wounds, bacterial infections (Gram + and Gram-) and fungal infections of the skin and ears - caused by sensitive germs - domestic animals. Indicated in:

- Dermal conditions of bacterial etiology (not viral or tuberculous).
- Surgical wounds (promotes aesthetic healing).
- Exudative, eczematous, seborrheic or contact dermatitis, intertrigo or other pyoderma, lacerations, abrasions or wounds.
- Adjuvant treatment in cases of allergic dermatitis by fleas, dermatosis and alopecia.
- Otitis externa, acute or chronic.
- Onychomycosis and dermal conditions of fungal etiology, ringworm.
- Infections of the paranal gland in dogs.

#### Susceptible Agents

**Vetamycon 6X** Is active against:

- **Bacterias:** *Streptococcus* spp, *Staphylococcus* spp, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus* spp, *Aerobacter* spp, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp, *Citrobacter* spp, *Enterobacter* spp, *Providencia* spp, *Salmonella* spp, *Serratia* spp, *Shigella* spp, among others.
- **Fungi:** *Malassezia* spp., *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* and *Candida albicans*.

#### Target Species

Cats and dogs, horses. Other species of domestic animals.

#### Administration Route And Dosage

Topical route on the skin, mucous membranes, wounds or within the ear canal or paranal glands.

#### Dermal Conditions:

Clean the affected area, dry. Apply a small amount of the suspension and distribute evenly or rub carefully.

#### Otic Conditions:

Clean the external ear canal, dry. Inspect the canal and remove foreign bodies such as fat, detritus, ticks, etc. Adapt the mouth of the tube to the plastic cannula and insert it into the canal, applying directly. Fill the ear canal to complete the treated area. Provide a light massage at the base of the ear to promote adherence and uniform distribution.

#### DESARROLLO DE EMPAQUES

Nombre del Archivo: VETAMYCON 6X / INSERTO (V1.0521).ai		Código:	
Coordinador: Giovanna Anchorena	Diseño: Karolina Valentino		
Software: Adobe Illustrator CS6	Fecha: 17-05-2021		
Fuentes: Helvetica Lt Std, Arial Narrow, Franklin Gothic Demi, Trebuchet MS			
Colores:			
Versión: V1.0521		Medidas	Díptico
			Ancho Largo
Destino: Perú		166 mm	210 mm
Descripción   Description:			
Material: Papel Bond   bond paper			
Gramaje   weight: 56 gr.			
Troquel   Die: No			
Doblez   Fold: Si			
Características   Characteristics:			
Color: Negro   Black			
Texto   Text: Texto Claro y legible   Clear and readable.			
Impresión   Print: Buena resolución y nitidez   Good resolution and sharpness.			