



## Vetocam 50

Página 1 de 3

## 1. GENERALIDADES

- 1.1. Nombre comercial: Vetocam 50
- 1.2. Clase de uso: Antiinflamatorio, analgésico y antipirético
- 1.3. Formulación: inyectable.

## 2. COMPOSICION

Componente	Cantidad	Unidad
Meloxicam	5	mg
Excipientes c.s.p.	1	mL

## 3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

- 3.1. Aspecto: Solución libre de impurezas.

## 4. DESCRIPCIÓN

Antiinflamatorio no esteroideo. Solución inyectable con acción Antiinflamatoria, Analgésica y Antipirética; COX-2 selectivo.

## 5. INDICACIONES

Bovinos:

Utilizado para la reducción de los signos clínicos de infecciones respiratorias agudas en el ganado bovino, conjuntamente con una adecuada antibioterapia. Indicado para la reducción de los signos clínicos de la diarrea en terneros de más de una semana de edad y jóvenes terneros no lactantes, en combinación con una terapia oral de re-hidratación. Para el alivio del dolor pos-operatorio ocasionado por el descorne en terneros.

Porcinos:

Utilizado para la reducir síntomas de la cojera e inflamación presentes en los desórdenes no infecciosos del aparato locomotor. Para el alivio del dolor pos-operatorio asociado con cirugías menores de tejidos blandos como la castración.

Perros:

Para el alivio de la inflamación y el dolor presente en desordenes musculoesqueléticos tanto agudos como crónicos. Para la reducción de la inflamación y dolor pos-operatorio presentes luego de cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

Gatos:

Utilizado para la reducción del dolor pos-operatorio presente después de una ovario histerectomía y otras cirugías menores de tejidos blandos.



## Vetocam 50

Página 2 de 3

### 6. ESPECIES DE DESTINO

Formulación desarrollada y probada para su uso en bovinos, porcinos, caninos y felinos.

### 7. ADMINISTRACIÓN

Intramuscular, subcutánea e intravenosa.

### 8. DOSIS

- Bovinos: 10.00 mL /100 kg, vía subcutánea o intravenosa.
- Porcinos: Para desordenes locomotores: 2.0 mL/25 kg vía intramuscular. Si es requerido, administrar una segunda dosis después de 24 horas de la última aplicación. Para reducción del dolor posoperatorio: 0.4 mL/5 kg.
- Caninos: Vía subcutánea o intravenosa. Para desordenes músculo esqueléticos 0.4 mL/10kg. Para reducción del dolor posoperatorio, si tiene un periodo mayor a 24 horas: 0.4 mL/10 kg
- Felinos: Vía subcutánea: 0.3 mL/5 kg de peso antes de la cirugía.

### 9. PRECAUCIONES

- Evitar usar el producto en animales severamente deshidratados, con hipovolemia o con hipotensión, los cuales requieren hidratación parenteral, siendo así un riesgo potencial de toxicidad renal.
- Durante la anestesia, se debe considerar el monitoreo y la fluido terapia. No se debe administrar ninguna terapia adicional con meloxicam u otros AINES en gatos.
- Puede inhibir la agregación plaquetaria y también causa ulceración gastrointestinal, si se emplea con otros fármacos que alteran la hemostasis, (por ejemplo, heparina, warfarina) y/o que causan erosión gastrointestinal, no combinar con otros AINEs o corticosteroides.
- No mezclar en el mismo envase con cualquier otra sustancia ajena al producto.
- No manipular este producto si sabe que es sensible o si se le ha aconsejado no trabajar con tales preparaciones.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Agrovet Market S.A. no se responsabiliza por las consecuencias derivadas del uso (del producto) diferente al indicado.

### 10. CONTRAINDICACIONES

- No usar en caso pacientes con hipersensibilidad al compuesto (en caso de anafilaxia administrar epinefrina parenteralmente), con sangrado o ulceración gastrointestinal, disfunción hepática, cardiaca o renal y con anormalidades hemorrágicas.
- Animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos pues aumenta la posibilidad de nefrotoxicidad.
- No usar en animales gestantes o lactantes.
- Para el tratamiento de la diarrea en terneros, no usar en animales menores de 1 semana de edad.
- No usar en cerdos menores de 2 días de edad.
- No se ha evaluado su uso en perros menores de 6 meses, gatos menores de 4 meses, gestantes o lactantes.



### 11. PERIODO DE RETIRO

Carne:

Bovinos: 15 días

Porcinos: 05 días

Leche: 05 días

### 12. ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente de 15 – 30°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Protéjase de la luz solar directa.

Manténgase alejado del alcance de los niños.

La eliminación debe ser de acuerdo con las regulaciones federales, estatales / provinciales y / o locales. La incineración es el método preferido de eliminación, cuando sea apropiado.

### 13. PRESENTACIÓN

Frascos, de 10mL, 20mL, 50mL, 100mL, 250mL y 500 mL.



## Vetocam 50

Page 1 of 2

## 1. GENERAL

- 1.1. Commercial name: Vetocam 50
- 1.2. Use class: Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic
- 1.3. Formulation: Injectable solution

## 2. COMPOSITION

Component	Quantity	Unit
Meloxicam	5	mg
Excipients q.s.ad.	1	mL

## 3. PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES

- 3.1. Aspect: free impurities solution.

## 4. DESCRIPTION

Nonsteroidal anti-inflammatory. Injectable solution with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic action; COX-2 selective.

## 5. INDICATIONS

Bovines:

Used for the reduction of clinical signs of acute respiratory infections in cattle, together with adequate antibiotic therapy. Indicated for the reduction of clinical signs of diarrhea in calves over one week old and young non-lactating calves in combination with oral rehydration therapy. For postoperative pain relief in calves caused by dehorning.

Swine:

Used to reduce the symptoms of lameness and inflammation present in non-infectious locomotor disorders. For the relief of post-operative pain associated with minor soft tissue surgery such as castration.

Dogs:

For relief of inflammation and pain present in musculoskeletal disorders in both acute and chronic. To reduce inflammation and postoperative pain after orthopedic surgeries and soft tissue.

Cats:

Used to reduce postoperative pain after ovarian hysterectomy and other minor soft tissue surgery.

## 6. TARGET ANIMALS

Formulation developed and tested for its use in cattle, swine, dogs and cats.

## 7. ADMINISTRATION

Intramuscular, subcutaneous and intravenous.

## 8. DOSAGE

- Cattle: 10.00 mL /100 kg, by subcutaneous or intravenous route.



## Vetocam 50

Page 2 of 2

- Swine: For locomotor disorders: 2.0 mL / 25 kg intramuscularly. If required, a second dose 24 hours after the last application. For reduction of postoperative pain: 0.4 mL / 5 kg.
- Dogs: by subcutaneous or intravenous route. For muscle-skeletal disorders 0.4 mL / 10kg. For reduction of postoperative pain, if you have a period greater than 24 hours: 0.4 mL / 10 kg.
- Cats: by subcutaneous route: 0.3 mL/5 kg bw before surgery.

## 9. PRECAUTIONS

- Avoid using the product in very severely dehydrated animals with hypovolemia or hypotension, which require parenteral hydration, making it a potential risk of renal toxicity.
- During anesthesia, you should consider monitoring and fluid therapy. Do not administer any additional therapy with meloxicam or other NSAIDs in cats.
- Can inhibit platelet aggregation and cause gastrointestinal ulceration, if used with other drugs affecting hemostasis (e.g., heparin, warfarin) and / or that cause gastrointestinal erosion, not combine with other NSAIDs or corticosteroids.
- Do not mix in the same container with any other substance foreign to the product.
- Do not handle this product if you know you are sensitized or if you have been advised not to work with such preparations.
- Keep out of reach of children.
- Agrovet Market SA is not responsible for the consequences of using (the product) other than described in this insert.

## 10. CONTRAINDICATIONS

- Do not use in patients with hypersensitivity to the compound (in case of anaphylaxis administer epinephrine parenterally), gastrointestinal bleeding or ulceration, impaired hepatic, cardiac or renal function and bleeding abnormalities.
- Animals dehydrated, hypovolaemic or hypotensive because it increases the possibility of nephrotoxicity.
- Do not use in pregnant or lactating animals.
- For the treatment of diarrhea in calves, do not use in animals less than 1 week old.
- Do not use in pigs less than 2 days old.
- It has not been evaluated for use in dogs less than 6 months, kittens under 4 months, pregnant or lactating.

## 11. WITHDRAWAL PERIOD

Cattle (meat and offal): 15 days; Swine (meat and offal): 5 days  
Milk: 5 days

## 12. STORAGE

Store at room temperature between 15 ° C and 30 ° C, in a cool dry place. Protect from direct sunlight. Disposal should be in accordance with local, state / provincial and / or local federal regulations. Incineration is the preferred method of removal, where appropriate. Keep away from children.

## 13. PRESENTATION

Flasks of 10mL, 20mL, 50mL, 100mL, 250mL and 500 mL.