

CEFOXI-TABS® C

Tableta Oral

Antibiótico cefalosporínico de última generación con inhibidor de resistencia bacteriana y larga vida media



Formulación

Cefpodoxima proxetil (equivalente a cefpodoxima 100 mg) 135 mg, clavulanato de potasio diluido (equivalente a ácido clavulánico 62.5 mg) 152.86 mg.

Indicaciones

Para el tratamiento y prevención de infecciones cutáneas (heridas, abscesos y piodermas) y tejidos blandos; neumonías, bronquitis, sinusitis, faringitis, tonsilitis, otitis media y otras infecciones del tracto respiratorio alto y bajo; infecciones del tracto genito-urinario y otras causadas por gérmenes sensibles a la asociación, principalmente cepas de *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus* resistentes a las penicilinas, *Streptococcus canis*, (grupo G, β hemolítico), *Escherichia coli*, *Pasteurella multocida* y *Proteus mirabilis*, entre otras.

Dosis y Administración

Vía oral. Caninos: 1 tableta por cada 10-20 kg (5-10 mg de cefpodoxime/kg) cada 24 horas por 7 días o hasta 3 días luego de la remisión de síntomas clínicos. Felinos: ½ tableta /10 Kg cada 12 horas ó ½ tableta /5 Kg cada 24 horas hasta 3 días luego de la resolución del cuadro. Los tratamientos y su duración son solo sugeridos, por lo que queda a cargo del Médico Veterinario tratante, pero nunca deberían ser menores a 3 días.

Presentación Comercial

Caja x 30 tabletas,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.82.31.I.0074



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.