

OTIDERMA-CEF®

Suspensión Ótica

Combinación antibiótica - antiinflamatoria



Formulación

Cefalexina monohidrato 20 mg, gentamicina 10 mg, Dexametasona fosfato sódico 0.075 mg, Vitamina A palmitato 1000 UI, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de otitis externa aguda y crónica, dermatitis, piodermas, laceraciones, abrasiones, heridas o cuando se necesite reducción de la inflamación y el dolor. Con la adición de dexametasona y vitamina A reduce las consecuencias del proceso infeccioso y participa manteniendo la integridad de los tejidos respectivamente.

Dosis y Administración

Para tratar otitis externa y otras condiciones inflamatorias del oído externo, llenar el canal auditivo externo con una cantidad suficiente hasta completar el área tratada. En piel o membranas mucosas, aplicar una pequeña cantidad de la suspensión, distribuir o frotar suavemente. El tratamiento debe realizarse de 1 a 3 veces al día, dependiendo del criterio del médico veterinario.

Presentación Comercial

Jeringa x 15 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.71.03.N.0014



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.