

PEN TETRA STREP® LC

Suspensión Intramamaria

Triple asociación sinérgica antibiótica -
antiinflamatoria de amplio espectro para el
tratamiento de la mastitis bovina



Formulación

Cada jeringa de 5 g contiene: Penicilina G Procaínica 100,000 UI, Estreptomicina Sulfato 100 mg, Neomicina Sulfato 100 mg, Prednisolona 10 mg, Excipientes c.s.p. 5 g.

Indicaciones

Tratamiento de mastitis clínica y subclínica bovina en vacas de ordeño, acompañada de dolor e inflamación causadas por infección bacteriana sensible a la terapia con penicilina, estreptomicina y neomicina como en casos de: Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis y Escherichia coli.

Dosis y Administración

Administración Pen Tetra Strep® LC se administra por vía intramamaria. Debe infundirse suavemente en cada cuarto infectado a través del canal del pezón inmediatamente después del ordeño. Una jeringa por cuarto afectado cada 24 horas, durante tres días consecutivos. Ordeñe los cuartos afectados y descarte la leche. Después de limpiar y desinfectar a fondo el pezón y el orificio del pezón, infunda suavemente el contenido de una jeringa en el canal del pezón de cada cuarto afectado. Dispersar el producto mediante suaves masajes en el pezón y ubre del animal afectado. Adoptar precauciones para evitar que la cánula de la jeringa se contamine.

Presentación Comercial

Contenedor x 48 jeringas x 5 g,

Registro Senasa



Perú: E-082005, E-082006, E-082007, E-082008, referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.